

Crépidote mou



Comestible, sans valeur Recommandation officielle:



NON COMESTIBLE

Nom latin: *Crepidotus mollis*

Famille: A lames > *Crepidotaceae* > *Crepidotus*

Caractéristiques du genre *Crepidotus* : chapeau: en forme de moule, assez petit, cuticule sèche, rarement gélatineuse - lames: adnées, trame régulière, brunâtre à maturité - pied: mince - remarques: saprophyte sur bois mort





- Synonymes:** *Derminus mollis*, *Crepidopus mollis*, *Agaricus gelatinosus*, *Agaricus canescens*, *Agaricus mollis*
- Chapeau:** 2-7cm, convexe en forme de coquille ou de rein à marge lisse et faiblement ondulée ou finement enroulée, recouvert de matière visqueuse et élastique facile à retirer, de couleur blanchâtre à tendance beige ou brunâtre par temps humide
- Lamelles:** fines, rayonnantes à partir du point d'attache, blanchâtres devenant brunâtres, avec lamelles intermédiaires
- Pied:** sans anneau, généralement inexistant, ou très court dans le prolongement du chapeau
- Chair:** blanche, élastique
- Odeur:** nulle
- Saveur:** nulle
- Habitat:** mai-novembre, en groupes de plusieurs individus parfois imbriqués, le plus souvent étagés sur les débris boisés ou souhes de feuillus, dont il est saprophyte
- Remarques:** Peut pousser toute l'année s'il n'y a pas de fortes gelées- la cuticule pelable est un critère déterminant pour le Crépidote mou
- Confusion:** *Pleurote styptique* (*Panellus stipticus*)
Pleurotus: sporée blanche avec pied, *Crepidotus*: sporée brune pas de pied.
- Détermination:** Carpophore > Lamelles sous le chapeau > Lames minces véritables > Chair élastique ou molle, du moins dans le chapeau > Sporée non blanche > Sporée ni noire ni blanche > Sporée brun ou rouille > En forme de moule, pied latéral réduit > Marge droite > *Crepidotus*
- Classification:** Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae > Agaricales > Strophariaceae > *Derminus*

Photos:





Photos micro:



Crépidote variable



Comestible, sans valeur

Recommandation officielle:



NON COMESTIBLE

Nom latin: Crepidotus variabilis

Famille: A lames > Crepidotaceae > Crepidotus

Caractéristiques du genre Crepidotus : chapeau: en forme de moule, assez petit, cuticule sèche, rarement gélatineuse - lames: adnées, trame régulière, brunâtre à maturité - pied: mince - remarques: saprophyte sur bois mort

- Synonymes:** Derminus sessilis, Claudopus variabilis, Crepidopus variabilis, Agaricus variabilis
- Chapeau:** 1-3cm, en forme de coquille parfois irrégulière à marge très légèrement enroulée ou sinueuse et ondulée, de couleur blanche
- Lamelles:** rayonnantes à partir du point d'attache, fines et espacées, de couleur blanche à crème rosissant puis brunissant en vieillissant
- Pied:** sans anneau, sans pied
- Chair:** blanche, mince
- Odeur:** neutre
- Saveur:** douce à légèrement astringente
- Habitat:** août-décembre, bois, brindilles de bois mort, fagots et broussailles sur le sol, parfois aussi sur tiges de plantes herbacées
- Remarques:** fréquente en tous lieux en Suisse romande
- Confusion:** peu de risque de confusion avec des champignons que l'on trouve en Suisse romande.
- Détermination:** Carpophore > Lamelles sous le chapeau > Lames minces véritables > Chair élastique ou molle, du moins dans le chapeau > Sporée non blanche > Sporée ni noire ni blanche > Sporée brun ou rouille > En forme de moule, pied latéral réduit > Marge droite > Crepidotus
- Classification:** Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae > Agaricales > Strophariaceae > Derminus

Photos:



Photos micro:

