

Clavaire chou-fleur



Comestible

Recommandation officielle:



NON COMESTIBLE

Nom latin: Ramaria botrytis

Famille: Autres > Clavariaceae

Caractéristiques du genre Clavariaceae : chapeau: - lames: - pied: - remarques:

Synonymes: Corallium botrytis, Clavaria botrytis

Chapeau: 5-15cm de hauteur et de largeur, ramifications charnues, serrées, ressemblant à du corail hérissé de multiples rameaux, touffe blanchâtre. Les rameaux sont blancs à la base, puis ochracés et de couleur rouge vif, pourpre vineux à l'extrémité

Lamelles: néant

Pied: sans anneau, court, radicant, sans transition claire avec le chapeau, massif et trapu, blanc jaunissant un peu avec l'âge. Chacun de ses rameaux est subdivisé en deux ou trois ramules vineuses de plus en plus effilées

Chair: tendre, cassante, fondante et compacte à la fois, très blanche dans le pied

Odeur: fruitée et agréable de pois vert chez les jeunes, puis amère chez les vieux

Saveur: amarescente à la longue

Habitat: juillet-octobre, bois feuillus et résineux ombragés, commune localement

Remarques: Ce curieux champignon ressemble un peu à du chou fleur ce qui lui a valu son nom. Comestible mais de saveur médiocre car les ramules qu'il est nécessaire de couper avant la préparation, ont un goût amer. Espèce similaire et toxique. L'identification de ces champignons n'est pas aisée.

Confusion: Clavaire élégante, Clavaire jolie (Corallium formosum) *similaire et toxique. L'identification de ces champignons n'est pas aisée.*

Conservation: Congélation

Classification: Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Phallomycetidae > Gomphales > Gomphaceae > Ramaria

Photos:



Clavaire en pilon, Clavaire en massue



Comestible, sans valeur Recommandation officielle:



NON COMESTIBLE

Nom latin: Clavariadelphus pistillaris

Famille: Autres > Clavariaceae > Clavariadelphus

Caractéristiques du genre Clavariadelphus : chapeau: en forme de massue, plein, assez grand - lames: inexistants - pied: massue - remarques: terrestre, probablement mycorrhizien

Synonymes: Clavaria pistillaris

Chapeau: diamètre jusqu'à 5cm, hauteur jusqu'à 25cm, en forme de massue à sommet arrondi, jaune citron clair puis brunissant ensuite, présence parfois de taches violacées, surface de l'ensemble lisse puis sillonnée longitudinalement. Le chapeau et le pied ne forment qu'un, il n'y a pas de séparation claire

Lamelles: néant

Pied: ne forme qu'un avec le chapeau

Chair: blanchâtre, devenant brunâtre au froissement, pleine, ferme puis spongieuse

Odeur: agréable

Saveur: d'abord douce, puis amère, piquante

Habitat: juillet-novembre, feuillus, principalement hêtres et chênes, avec une nette préférence pour les sols calcaires

Remarques: son goût terriblement amer n'invite pas à la consommation. Sa soeur, la clavaire tronquée a une saveur qui n'est pas amère et qui penche même vers la douceur.

Confusion: Clavaire tronquée (*Clavariadelphus truncatus*)

Détermination: Carpophore > Ni lamelles, ni tubes, ni pores, ni aiguillons sous le chapeau > Entièrement à l'air libre à maturité > Non étalé sur le bois sous forme de croûte > Ni l'aspect d'une croûte, ni la forme d'un dé à coudre > Pas l'aspect de petites masses hémisphériques > Forme d'origine pas sphérique > Chair non cassante comme de la cire ou champignon dressé avec tige en massue ou en branches ramifiées > Pas en forme de trompette, ni de cornet > Chair fragile ferme et cassante > Pied moyen à épais > Tige simple en massue > A terre, ocre jaunâtre > *Clavariadelphus*

Classification: Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Phallomycetidae > Gomphales > Gomphaceae > *Clavariadelphus*

Photos:



Clavaire tronquée



Comestible

Recommandation officielle:



NON COMESTIBLE

Nom latin: Clavariadelphus truncatus

Famille: Autres > Clavariaceae > Clavariadelphus

Caractéristiques du genre Clavariadelphus : chapeau: en forme de massue, plein, assez grand - lames: inexistantes - pied: massue - remarques: terrestre, probablement mycorrhizien

- Synonymes:** Clavariadelphus truncatus var. lovejoyae, Clavariadelphus borealis, Clavariadelphus lovejoyae, Trombetta pistillaris, Craterellus pistillaris
- Chapeau:** 2.5-5cm de largeur au sommet, jusqu'à 1,5 cm à la base, dressé, simple ou parfois fourchu, clavé à largement clavé, obtus ou largement arrondi et aplati latéralement à l'apex au début, puis souvent tronqué à turbiné au sommet, à disque plat, déprimé et finement excavé ou perforé, en un chapeau rudimentaire, parfois très renflé comme une chanterelle à l'apex. Cylindrique dans sa jeunesse puis en forme de massue et son sommet devient rapidement tronqué voire concave. C'est sur cette surface plate que se forment des veines sortes de boursouflures irrégulières et épaisses. Certains spécimens rappellent même les chanterelles lorsque les plis gagnent l'hyménium et ont une orientation verticale. Dans sa jeunesse, elle est jaunâtre, ochracé, jaune clair, puis devient orangée ou roussâtre avec l'âge. Sa surface est rugueuse. Marge débordante, obtuse, très fragile
- Lamelles:** plis, latéral, lisse puis ruguleux à ruguleux longitudinalement, souvent ridé-plissé à veiné, surtout vers l'apex, plus pâle à l'apex au début, jaune beurre, jaune melon, orange pâle, jaune abricot, jaune doré, orange capucine à chamois orangé, puis jaune orangé, ± brun orangé, ochracé à orange brunâtre, se tachant lentement et irrégulièrement de la même couleur que la chair au froissement, plus distinctement vers la base
- Pied:** sans anneau, peu distinct, atténué vers la base en un bulbe arrondi, lisse ou ridé, rond à la coupe, souvent pâle, blanc, crème, jaune pâle à chamois pâle, avec tomentum blanc formé d'hyphes mycéliennes lâchement agrégées ou agglomérées en cordons rhizomorphiques blancs à pâles jusqu'à 0.1 cm de diamètre
- Chair:** assez tenace ou solide au début, épaisse, cotonneuse, molle, devenant molle et spongieuse ou creuse vers l'apex élargi, blanche, pâle à ochracée, se tachant lentement et irrégulièrement de brun pâle, de brunâtre, cannelle à brun rougeâtre à la coupe
- Odeur:** indistincte, agréable
- Saveur:** indistincte, douce à sucrée ou amère-sucrée
- Habitat:** août-octobre, mycorrhizique, sur sol et litière des forêts de conifère et mixte, sol riche, en troupes, plutôt en montagne, rare en plaine
- Remarques:** caractérisé par sa saveur douce
- Confusion:** Clavaire en pilon, Clavaire en massue (Clavariadelphus pistillaris)
au goût amer qui la rend inconsumable
- Conservation:** Congélation
- Détermination:** Carpophage > Ni lamelles, ni tubes, ni pores, ni aiguillons sous le chapeau > Entièrement à l'air libre à maturité > Non étalé sur le bois sous forme de croûte > Ni l'aspect d'une croûte, ni la forme d'un dé à coudre > Pas l'aspect de petites masses hémisphériques > Forme d'origine pas sphérique > Chair non cassante comme de la cire ou champignon dressé avec tige en massue ou en branches ramifiées > Pas en forme de trompette, ni de cornet > Chair fragile ferme et cassante > Pied moyen à épais > Tige simple en massue > A terre, ocre jaunâtre > Clavariadelphus
- Classification:** Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Phallomycetidae > Gomphales > Gomphaceae > Clavariadelphus > Clavariadelphus truncatus

Photos:



