

Sparassis lamelleux



Comestible

Recommandation officielle:



COMESTIBLE

Nom latin: Sparassis brevipes

Famille: Autres > Sparassidaceae > Sparassis

Caractéristiques du genre Sparassis : chapeau: en forme d'éponge naturelle, aux éléments (issus d'un tronc commun) crépus, ondulés, soudés en rubans, revêtus des deux côtés de la couche fertile - lames: inexistantes - pied: inexistant - remarques: parasite des racines et saprophyte, provoque une pourriture blanche

- Synonymes:** Maseeola laminosa, Sparassis crispa var. laminosa, Sparassis laminosa
- Chapeau:** 10-50cm de diamètre, en masse difforme paraissant une grande éponge, une chicorée frisée ou un chou-fleur formée de nombreux rameaux aplatis lobés, sinueuses ou ondulés mais compacts. Extrémité des ramifications foliacée, plate, en ruban, en lanière ou encore en petit éventail. Crème à fauve clair à tendance roussissante en vieillissant
- Lamelles:** néant
- Pied:** sans anneau, tronc blanc, charnu et trapu qui se divise en ramifications
- Chair:** d'abord blanchâtre, puis tendance au roussissement
- Odeur:** léger de cannelle et de noix mêlés, plus intense à la cuisson, tendance à sentir la javelle
- Saveur:** noix, douce
- Habitat:** juillet-octobre, à terre au pied des arbres, surtout feuillus, parfois sur souches de conifères, relativement courant en montagne, local. Il a la particularité de repousser chaque année, jusqu'à disparition totale de la souche, à condition de ne pas l'arracher mais de le couper au ras du tronc
- Remarques:** développement parfois impressionnant et il peut atteindre un poids d'une dizaine de kilos ! A l'état juvénile, c'est un excellent comestible caractérisé par une agréable saveur de noix et un croquant délicat. Au-delà d'une certaine maturité, dès qu'il commence à roussir, il devient progressivement plus coriace, caoutchouteux ... Et laxatif
- Confusion:** Clavaire chou-fleur (Ramaria botrytis)
surtout lorsque le carpophore n'est pas encore développé
Clavaire élégante, Clavaire jolie (Corallium formosum)
quoique la taille diffère fortement
Sparassis crépu (Sparassis crispa)
- Détermination:** Carpophore > Ni lamelles, ni tubes, ni pores, ni aiguillons sous le chapeau > Entièrement à l'air libre à maturité > Non étalé sur le bois sous forme de croûte > Ni l'aspect d'une croûte, ni la forme d'un dé à coudre > Pas l'aspect de petites masses hémisphériques > Forme d'origine pas sphérique > Chair non cassante comme de la cire ou champignon dressé avec tige en massue ou en branches ramifiées > Pas en forme de trompette, ni de cornet > Chair non cassante, souple ou gélatineuse, cartilagineuse > Tronc ramifié > Rameaux aplatis, en lanières ou difformes > Rameaux contournés, ocracés à jaunâtres > Ressemble à un chou-fleur rameaux assez fragiles, sur conifères > Sparassis
- Détermination:** Carpophore > Ni lamelles, ni tubes, ni pores, ni aiguillons sous le chapeau > Entièrement à l'air libre à maturité > Non étalé sur le bois sous forme de croûte > Ni l'aspect d'une croûte, ni la forme d'un dé à coudre > Pas l'aspect de petites masses hémisphériques > Forme d'origine pas sphérique > Chair non cassante comme de la cire ou champignon dressé avec tige en massue ou en branches ramifiées > Pas en forme de trompette, ni de cornet > Chair fragile ferme et cassante > Pied moyen à épais > Tronc ramifié > Rameaux en lanières > Sparassis
- Classification:** Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Polyporales > Sparassidaceae > Maseeola

Photos:





Sparassis crépu



Comestible

Recommandation officielle:



COMESTIBLE

Nom latin: Sparassis crispa

Famille: Autres > Sparassidaceae > Sparassis

Caractéristiques du genre Sparassis : chapeau: en forme d'éponge naturelle, aux éléments (issus d'un tronc commun) crépus, ondulés, soudés en rubans, revêtus des deux côtés de la couche fertile - lames: inexistantes - pied: inexistant - remarques: parasite des racines et saprophyte, provoque une pourriture blanche

Synonymes: Sparassis radicata, Maseeola crispa, Merisma crispum, Clavaria crispa, Elvela ramosa, Helvella ramosa

Chapeau: 10-50cm de diamètre, en masse difforme paraissant une grande éponge, une chicorée frisée ou un chou-fleur formée de nombreux rameaux aplatis lobés et ondulés mais compacts, de couleur crème à fauve clair à tendance roussissante en vieillissant

Lamelles: néant

Pied: sans anneau, pied radican, constitué d'un tronc épais et court, passant souvent inaperçu sous la masse des rameaux. Sa couleur est crème jaunâtre, un peu roussie ou brunie localement

Chair: blanche, élastique à marbrures translucides et sa consistance un peu tenace ressemblant à de la cire d'abeille

Odeur: parfum léger de résine, d'anis, cannelle et de noix mêlés, plus intense à la cuisson

Saveur: noisette

Habitat: août-octobre, le plus souvent sur souches de conifères, généralement en adossement de ceux-ci, sur troncs et souches de pins

Remarques: peut atteindre un poids d'une dizaine de kilos ! A l'état juvénile, c'est un excellent comestible caractérisé par une agréable saveur de noix et un croquant délicat. Au-delà d'une certaine maturité, dès qu'il commence à roussir, il devient progressivement plus coriace, caoutchouteux et laxatif. Excellent cru en salade. Il a la particularité de repousser chaque année, jusqu'à disparition totale de la souche, à condition de ne pas l'arracher mais de le couper au ras du tronc.

Confusion: Clavaire chou-fleur (Ramaria botrytis)
Clavaire élégante, Clavaire jolie (Corallium formosum)
Sparassis lamelleux (Sparassis brevipes)

Détermination: Carpophore > Ni lamelles, ni tubes, ni pores, ni aiguillons sous le chapeau > Entièrement à l'air libre à maturité > Non étalé sur le bois sous forme de croûte > Ni l'aspect d'une croûte, ni la forme d'un dé à coudre > Pas l'aspect de petites masses hémisphériques > Forme d'origine pas sphérique > Chair non cassante comme de la cire ou champignon dressé avec tige en massue ou en branches ramifiées > Pas en forme de trompette, ni de cornet > Chair non cassante, souple ou gélatineuse, cartilagineuse > Tronc ramifié > Rameaux aplatis, en lanières ou difformes > Rameaux contournés, ocracés à jaunâtres > Ressemble à un chou-fleur rameaux assez fragiles, sur conifères > Sparassis

Détermination: Carpophore > Ni lamelles, ni tubes, ni pores, ni aiguillons sous le chapeau > Entièrement à l'air libre à maturité > Non étalé sur le bois sous forme de croûte > Ni l'aspect d'une croûte, ni la forme d'un dé à coudre > Pas l'aspect de petites masses hémisphériques > Forme d'origine pas sphérique > Chair non cassante comme de la cire ou champignon dressé avec tige en massue ou en branches ramifiées > Pas en forme de trompette, ni de cornet > Chair fragile ferme et cassante > Pied moyen à épais > Tronc ramifié > Rameaux en lanières > Sparassis

Classification: Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Polyporales > Sparassidaceae > Sparassis

Photos:





Photos micro:

