

Boviste des marais



Comestible, sans valeur Recommandation officielle:



NON COMESTIBLE

Nom latin: *Bovista paludosa*

Famille: Autres > Lycoperdaceae > Bovista

Caractéristiques du genre *Bovista* : chapeau: souvent globuleux, se détachant facilement du mycélium à maturité, masse de spores rejetées par une ouverture au sommet, pédicule stérile, nul ou réduit, plus rarement bien développé - lames: inexistants - pied: inexistant - remarques: saprophyte, terrestre, toutes les espèces sont comestibles jeunes, tant que l'intérieur est blanc, voir *Scléroderma*

- Synonymes:** *Bovistella humidicola*, *Bovista lycoperdoides*, *Lycoperdon bubakii*, *Bovistella paludosa*, *Calvatia paludosa*, *Scleroderma cookei*, *Mycenastrum lycoperdoides*, *Bovista tunicata* var. *pyriformis*
- Chapeau:** 2-4 cm, d'abord blanc, surface lisse ou faiblement cloisonnée, brun couvré à brun-noir à maturité, globuleux ou avec tête et pédicule
- Lamelles:** néant
- Pied:** néant, pédicule stérile bien distinct
- Chair:** molle, blanche jeune, vert-olive à maturité
- Odeur:** neutre
- Saveur:** neutre
- Habitat:** juin-octobre, tourbières, terrain acide, en montagne. Très rare en plaine.
- Remarques:** identifiable à son habitat et sa surface lisse
- Confusion:** Vesse-de-loup perlée (*Lycoperdon perlatum*)
Le Boviste des marais est plus lisse et plus grand
- Détermination:** Carpophore > Ni lamelles, ni tubes, ni pores, ni aiguillons sous le chapeau > Entièrement à l'air libre à maturité > Non étalé sur le bois sous forme de croûte > Ni l'aspect d'une croûte, ni la forme d'un dé à coudre > Pas l'aspect de petites masses hémisphériques > Avant maturité champignon sphérique, semi-enterré ou au ras du sol > Pas de couche interne gélatineuse, à maturité sphère laissant échapper un nuage de spores > Couche externe blanche, souple > Champignon sphérique, sans amorce de pied > *Bovista*
- Classification:** Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae > Agaricales > Agaricaceae > *Bovistella*

Photos:



Boviste plombée



Comestible

Recommandation officielle:



NON COMESTIBLE

Nom latin: *Bovista plumbea*

Famille: Autres > Lycoperdaceae > Bovista

Caractéristiques du genre *Bovista* : chapeau: souvent globuleux, se détachant facilement du mycélium à maturité, masse de spores rejetées par une ouverture au sommet, pédicule stérile, nul ou réduit, plus rarement bien développé - lames: inexistants - pied: inexistant - remarques: saprophyte, terrestre, toutes les espèces sont comestibles jeunes, tant que l'intérieur est blanc, voir *Scléroderma*

Synonymes: *Calvatia purpurea*, *Bovista plumbea* var. *ovalispora*, *Bovista plumbea* f. *brevicauda*, *Bovista plumbea* var. *brevicauda*, *Bovista macrospora*, *Bovista nigra*, *Bovista sulphurea*, *Bovista purpurea*, *Bovista brevicauda*, *Bovista pallida*, *Bovista ovalispora*, *Globalia plumbea*, *Globalia tunicata*, *Bovista nuciformis*, *Bovista tunicata*, *Lycoperdon arrhizon*, *Lycoperdon arrhizum*, *Lycoperdon ardesiacum*, *Lycoperdon ardosiacum*

Chapeau: 1.5-5cm, globuleux, un peu déprimé, avec base souvent plissée au point d'attachement, faiblement fixé au substrat par des petits filaments rhizomorphiques englobant débris végétaux, qui se rompent souvent à maturité, laissant le basidiome libre de rouler sous l'action du vent, à exopéridium épais, fragile, lisse à légèrement bosselé-ridé, se fragmentant en plaques aréolées fugaces, glabre et blanc puis finement tomenteux et jaunâtre à tan pâle. Sac sporifère mince, papyracé, lisse, blanchâtre puis terne, gris bleuâtre à gris foncé, avec reflets métalliques, s'ouvrant par un pore circulaire lobé, sans sous-glèbe

Lamelles: sans lames

Pied: sans anneau, sans pied, se réduit à un mince filament, comme une racine puisant la subsistance du champignon dans le sol

Chair: blanche et ferme au début, puis jaune olive et molle, brun olivâtre foncé puis brun chocolat foncé et poudreuse à maturité

Odeur: faible, fongique

Saveur: neutre

Habitat: juillet-octobre, solitaire, dispersé ou grégaire, saprotrophe, en milieux herbeux ouverts, pelouses, pâturages, parcs, vieux vergers, terrains de golf, cimetières et lieux similaires, le long des routes

Remarques: comestible lorsque la chair est blanche et homogène. Après le jaunissement de l'enveloppe, celle-ci se déchire pour laisser apparaître une enveloppe intérieure grisâtre, de couleur plomb (d'où son nom) d'abord luisante puis devenant mate.

Confusion: peu de risque de confusion avec des champignons que l'on trouve en Suisse romande.

Conservation: Séchage - Poudre

Détermination: Carpophore > Ni lamelles, ni tubes, ni pores, ni aiguillons sous le chapeau > Entièrement à l'air libre à maturité > Non étalé sur le bois sous forme de croûte > Ni l'aspect d'une croûte, ni la forme d'un dé à coudre > Pas l'aspect de petites masses hémisphériques > Avant maturité champignon sphérique, semi-enterré ou au ras du sol > Pas de couche interne gélatineuse, à maturité sphère laissant échapper un nuage de spores > Couche externe blanche, souple > Champignon sphérique, sans amorce de pied > *Bovista*

Classification: Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae > Agaricales > Lycoperdaceae > *Calvatia*

Photos:

