

# Oreille de lièvre



Comestible, sans valeur Recommandation officielle:



**NON COMESTIBLE**

*Nom latin: Otidea leporina*

*Famille: Autres > Pezizaceae > Otidaceae*

*Caractéristiques du genre Otidaceae : chapeau: auriculé, en gobet ou en coupe, fendu d'un côté, base brièvement pédonculée, couche fertile sur la face interne - lames: inexistantes - pied: inexistant - remarques: saprophyte, terrestre*

**Synonymes:** Otidea fuckelii, Otidea crassa, Helvella leporina, Otidea myosotis, Otidea leporina var. rubescens, Scodellina auricula, Otidea auricula, Otidea leporina var. minor, Wynnella auricula, Otidea leporina f. major, Otidea leporina f. minor, Scodellina leporina, Peziza leporina, Elvela auricula

**Chapeau:** 2-4cm, rièvement stipité, dressé, fendu d'un côté, en forme d'oreille, lisse et brun à l'intérieur, avec parfois une teinte un peu vineuse ou purpurine, grisâtre, alutacé ou roussâtre et farineux à l'extérieur, uni et vilieux à la base

**Lamelles:** sans lames

**Pied:** sans anneau, blanchâtre, court, atténué à la base, duveteux, arrivant d'un mycélium relié à la litière

**Chair:** mince, brune, fragile

**Odeur:** indistincte

**Saveur:** indistincte

**Habitat:** septembre-octobre, dans la terre, parmi les aiguilles ou la mousse, dans les bois surtout en montagne, sous épicéa. Grégaire (surtout en petites touffes). Assez rare

**Remarques:** le type de forêt le sépare de son cousin qui pousse dans les feuillus

**Confusion:** Oreille de lièvre, Oreille d'âne (Otidea onotica)  
*Leporina: résineux, Onotica: feuillus*

**Classification:** Fungi > Dikarya > Ascomycota > Pezizomycotina > Pezizomycetes > Pezizomycetidae > Pezizales > Pyronemataceae > Otidea

## Photos:



# Oreille de lièvre, Oreille d'âne



Comestible, sans valeur Recommandation officielle:



**NON COMESTIBLE**

Nom latin: *Otidea onotica*

Famille: Autres > Pezizaceae > Otidaceae

Caractéristiques du genre *Otidaceae* : chapeau: auriculé, en gobet ou en coupe, fendu d'un côté, base brièvement pédonculée, couche fertile sur la face interne - lames: inexistantes - pied: inexistant - remarques: saprophyte, terrestre

- Synonymes:** Peziza var. onotica, Scodellina onotica, Peziza rosea, Peziza onotica
- Chapeau:** 3-10cm, dressée, asymétrique, en cuillère, oreille allongée ou coupe, avec un côté ouvert ou fendu, à marge plus ou moins enroulée, ondulée, glabre
- Lamelles:** sans lame, face interne lisse, crème rosé, abricot, teintée de rosâtre, parfois tachée de rouille à la fin. Face externe finement granuleuse, jaunâtre à jaune orangé pâle
- Pied:** sans anneau, rudimentaire, très court, atténué vers la base, poilu à duveteux, blanchâtre, arrivant d'un mycélium relié à la litière, enfoncé dans la mousse ou la litière
- Chair:** rudimentaire, très court, atténué vers la base, poilu à duveteux, blanchâtre, arrivant d'un mycélium relié à la litière, élastique
- Odeur:** indistincte
- Saveur:** indistincte
- Habitat:** août-octobre, souvent en troupes denses, parfois solitaire ou dispersé, saprotrophe, sur sol des forêts de feuillus, apprécie la couverture des chênes, la litière et la terre nue
- Remarques:** aussi nommée Oreille de lapin
- Confusion:** Oreille de lièvre (*Otidea leporina*)  
*Leporina*: résineux, *Onotica*: feuillus
- Classification:** Fungi > Dikarya > Ascomycota > Pezizomycotina > Pezizomycetes > Pezizomycetidae > Pezizales > Pezizaceae > Peziza

## Photos:

