

# Stérée pourpre



Comestible, sans valeur

Recommandation officielle:  **NON COMESTIBLE**



Nom latin: *Chondrostereum purpureum*

Famille: Autres > Stereaceae > Stereum

Caractéristiques du genre *Stereum* : chapeau: recouvrant généralement le substrat par ses chapeaux superposés, ondulés, lobés, couche fertile lisse, sans aiguillons ou plis sur la face inférieure du chapeau, chair coriace-élastique - lames: inexistantes - pied: inexistant - remarques: saprophyte et parasite de faiblesse sur le bois, provoque une pourriture blanche

- Synonymes:** *Stereum nipponicum*, *Stereum ardoisiacum*, *Phylacteria micheneri*, *Stereum argentinum*, *Terana nyssae*, *Stereum lilacinum* var. *vorticolum*, *Stereum spagazzinianum*, *Stereum atrozonatum*, *Stereum pergamenum*, *Corticium nyssae*, *Stereum micheneri*, *Stereum rugosiusculum*, *Stereum vorticolum*, *Thelephora vorticosa*, *Stereum purpureum*
- Chapeau:** 1-3cm, sessile lorsque présent, ondulé, souvent en amas imbriqués de 10-50 cm de longueur, parfois crépu ou lobé, poilu, hirsute-tomenteux, glabrescent, indistinctement zoné, brun foncé, ocre chamois pâle, chamois cannelle, chamois jaunâtre, grisâtre à gris blanchâtre, à marge distinctement délimitée à légèrement frangée, aiguë, souvent nettement plus pâle
- Lamelles:** sans lames, hyménophore lisse, tuberculé-ondulé à légèrement plissé, finement poudreux, d'apparence cireuse, violacé foncé, pourpré à brun-violacé, violet-rose, chamois vineux foncé au frais et à l'humidité, plus pâle au sec
- Pied:** sans anneau, sans pied
- Chair:** tenace à coriace au frais, cassante au sec, avec ligne foncée à noire visible à la coupe, séparant le contexte et le tomentum piléique
- Odeur:** indistincte
- Saveur:** douce
- Habitat:** janvier-décembre, saprotrophe ou parasite, sur bois de feuillus, rarement de conifères, branches, troncs, souches, billes et pulpe, agent de carie blanche
- Remarques:** pousse toujours en groupes importants, se reconnaît à sa couleur rosée
- Confusion:** peu de risque de confusion avec des champignons que l'on trouve en Suisse romande.
- Détermination:** Carpophore > Ni lamelles, ni tubes, ni pores, ni aiguillons sous le chapeau > Entièrement à l'air libre à maturité > Champignon étalé, en forme de croûte > Chair solide, dure > Plus ou moins décollé du support, non rouge > *Stereum*
- Classification:** Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae > Agaricales > Cyphellaceae > *Chondrostereum*

## Photos micro:



# Stérée hirsute



Comestible, sans valeur Recommandation officielle:



**NON COMESTIBLE**

Nom latin: *Stereum hirsutum*

Famille: Autres > Stereaceae > Stereum

Caractéristiques du genre *Stereum* : chapeau: recouvrant généralement le substrat par ses chapeaux superposés, ondulés, lobés, couche fertile lisse, sans aiguillons ou plis sur la face inférieure du chapeau, chair coriace-élastique - lames: inexistantes - pied: inexistant - remarques: saprophyte et parasite de faiblesse sur le bois, provoque une pourriture blanche

- Synonymes:** *Stereum leoninum*, *Stereum hirsutum* var. *ochraceum*, *Stereum necator*, *Stereum bombycinum*, *Stereum azonum*, *Stereum cinericium*, *Stereum varicolor*, *Stereum persoonianum*, *Stereum kalchbrenneri*, *Stereum sarmienti*, *Stereum amoenum*, *Stereum aratae*, *Stereum hirsutum* var. *rameale*, *Thelephora ramealis*, *Thelephora hirsuta*
- Chapeau:** 2-7cm, en forme de console à surface velue, jaunâtre à jaune et orangé plus ou moins prononcées en zones concentriques plus ou moins marquées, à marge ondulée de couleur d'abord blanchâtre puis jaunâtre à jaune
- Lamelles:** néant, hyménium lisse à finement ridé de couleur jaunâtre à jaune
- Pied:** sans anneau, sans pied, prolongement du carpophore se fixant sur l'hôte
- Chair:** mince, jusqu'à 1 mm d'épaisseur, crème blanchâtre, jaune à ochracé, avec très mince couche jaune orangé à rouge brunâtre entre le contexte et le tomentum, parfois indistincte, coriace, membraneux et élastique au frais, dure et cireuse au sec
- Odeur:** neutre
- Saveur:** neutre
- Habitat:** janvier-décembre, bois de feuillus, se développant en bandes de plusieurs individus, parfois en véritables colonies, sur le bois mort et aussi sur les coupes
- Remarques:** toute l'année mais se développant plus particulièrement de l'été jusqu'au début de l'hiver. Ressemble à une chips de patate.
- Confusion:** peu de risque de confusion avec des champignons que l'on trouve en Suisse romande.
- Détermination:** Carpophore > Ni lamelles, ni tubes, ni pores, ni aiguillons sous le chapeau > Entièrement à l'air libre à maturité > Champignon étalé, en forme de croûte > Chair solide, dure > Plus ou moins décollé du support, non rouge > *Stereum*
- Classification:** Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Russulales > Stereaceae > *Stereum*

## Photos:





# Stérée sanguinolente



Comestible, sans valeur Recommandation officielle:



**NON COMESTIBLE**

Nom latin: *Stereum sanguinolentum*

Famille: Autres > Stereaceae > Stereum

Caractéristiques du genre *Stereum* : chapeau: recouvrant généralement le substrat par ses chapeaux superposés, ondulés, lobés, couche fertile lisse, sans aiguillons ou plis sur la face inférieure du chapeau, chair coriace-élastique - lames: inexistantes - pied: inexistant - remarques: saprophyte et parasite de faiblesse sur le bois, provoque une pourriture blanche

- Synonymes:** Stereum acanthophysatum, Haematostereum sanguinolentum, Stereum balsameum, Merulius sanguinolentus, Auricularia sanguinolenta, Phlebomorpha sanguinolenta, Thelephora sericea var. sanguinolenta, Thelephora sanguinolenta
- Chapeau:** 2-5cm, omboné-sessile à subcupuliforme, largement dimidié à étroitement attaché, aplani à plissé, sillonné radialement, ondulé, lobé à incisé, tomenteux, avec zones hirsutes à finement strigieuses-feutrées, surtout avec l'âge, zoné à tomentum avec 1-2 zones concentriques, paille, chamois, chamois cannelle, blanc grisâtre, brunâtre, brun, gris, orange grisâtre, brun orangé jaune-rouge et brun-rouge, souvent teinté de gris violacé, parfois verdâtre par les algues, vite glabrescent et exposant le cortex jaune-rougeâtre à brun, à marge incurvée, étroite, sinueuse, crénelée, distinctement délimitée, blanchâtre à chamois pâle
- Lamelles:** néant, hyménophore lisse à irrégulièrement bosselé-ridulé parfois ruguleux, rarement tuberculé, craquant et montrant le contexte, jaunâtre, chamois pâle, gris à gris brunâtre, souvent teinté de rougeâtre à violacé, brun foncé au sec, exsudant immédiatement un liquide abondant rosâtre à rougeâtre au froissement ou à la meurtrissure
- Pied:** sans anneau, pied quasi nul, pâle, beige à ochracé souvent par petites taches foncées, séparé du tomentum par une fine ligne brun foncé
- Chair:** croûteux-coriace, tenace et élastique au frais, dure et coriace au sec
- Odeur:** nulle
- Saveur:** nulle
- Habitat:** janvier-décembre, sur bois de conifères, écorces, écorces moussues, branches et troncs morts et pourris, jeunes arbres morts, bois mort, cortiqué ou non, troncs d'arbres vivants, souches, billes, solitaire, souvent fusionné latéralement ou en amas imbriqués, commune
- Remarques:** agent de pourriture blanche
- Confusion:** Tramète versicolore, Polypore versicolore, polypore de couleur variable (Trametes versicolor) à l'état jeune
- Détermination:** Carpophore > Ni lamelles, ni tubes, ni pores, ni aiguillons sous le chapeau > Entièrement à l'air libre à maturité > Champignon étalé, en forme de croûte > Chair solide, dure > Plus ou moins décollé du support, non rouge > Stereum
- Classification:** Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Russulales > Stereaceae > Stereum

## Photos:

