

Polypore tomenteux



Comestible, sans valeur

Recommandation officielle:



NON COMESTIBLE

Nom latin: *Onnia tomentosa*

Famille: *A tubes > Hymenochaetaceae > Onnia*

Caractéristiques du genre *Onnia* : chapeau: feutré, irrégulièrement lobé, non zoné, chair brun-roux, liégeux-coriace - lames: tubes - pied: pied court - remarques: parasite, saprophyte sur bois, racine, provoque une pourriture blanche

- Synonymes:** *Inonotus tomentosus*, *Polyporus peakensis*, *Coltricia tomentosa*, *Xanthochrous tomentosus*, *Microporus tomentosus*, *Mucronoporus tomentosus*, *Pelloporus tomentosus*, *Polystictus tomentosus*, *Polyporus tomentosus*
- Chapeau:** 3-11 cm, simple, circulaire, ovale à flabelliforme, déprimé au centre, parfois lobé, semi-coriace au frais, plutôt contracté et dur au sec, parfois orné de chapeaux secondaires, tomenteux à finement feutré, ondulée, bosselé à rugueux longitudinalement, non à indistinctement zoné concentriquement, brun jaunâtre, brun cannelle à ferrugineux, à marge incurvée, mince, aiguë, ondulée, entière, fertile ou stérile au-dessous, plus pâle, couleur jaune d'or à brun jaunâtre, noueux, partie supérieure molle-spongieuse
- Lamelles:** tubes, surface chamois pâle au début, grise, gris-brun à brun plus foncé avec l'âge, couche décurrente, mais nettement limitée sur le pied, brune, remplie de mycélium et apparaissant plus pâle que le contexte, jusqu'à 5 mm de longueur, pores irrégulièrement ronds-anguleux, 2-4 par mm, plus grands vers la marge, à dissépiments épais au début, minces et lacérés-fimbriés à l'arête avec l'âge
- Pied:** jusqu'à 4 x 2 cm, centré, excentré à latéral, souvent fusionné à d'autres à la base, conique, noueux, feutré, brun rouille à concolore au chapeau
- Chair:** jaune d'or à brun jaunâtre, noueux, duplexe: partie supérieure molle-spongieuse, partie inférieure ferme-fibreuse, jusqu'à 4 mm d'épaisseur au total
- Odeur:** agréable, de curry
- Saveur:** douce
- Habitat:** janvier-décembre, parasitique, sur bois vivant de conifères, racines et bases; agent de carie blanche de coeur, se caractérisant par de grandes alvéoles vides nettement délimitées par le bois ferme, apparemment sain
- Remarques:** sa chair coriace en fait un champignon non comestible.
Confusion possible avec d'autres Polypore du type *Onnia*
- Confusion:** Polypore anisé, *Gloeophyllum odorant* (*Gloeophyllum odoratum*)
Le Polypore anisé a une odeur typique
- Détermination:** Carpophore > Tubes ou pores sous le chapeau > Chaire dure ou pied non central (Polypores) > Sur bois > Chapeaux simples > Ne dépassant pas le support de plus de 15 cm > Pied central et grêle > Chapeau feutré > *Onnia*
- Classification:** Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Hymenochaetales > Hymenochaetaceae > *Inonotus*

Photos:

