Bolet à spores pourpres

Comestible, sans valeur **Recommandation officielle:** NON COMESTIBLE

Nom latin: Porphyrellus porphyrosporus

Famille: A tubes > Boletaceae

Caract?ristiques du genre Boletaceae : chapeau: - lames: - pied: - remarques:

Synonymes:	Tylopilus porphyrosporus, Phaeoporus porphyrosporus, Suillus porphyrosporus, Boletus porphyrosporus
Chapeau:	5-15 cm, d'abord hémisphérique puis convexe, s'aplanissant à la fin, gris olivacé sombre à brun noirâtre à marge épaisse, un peu débordante, unie, concolore et revêtement sec, finement velouté
Lamelles:	pores, petits, grisâtres puis brun vineux sale avec des nuances olivâtres au début, bleuissant au toucher
Pied:	cylindrique, souvent clavé, parfois radicant, plein et dur, brun sombre, blanc à la base
Chair:	épaisse, ferme, blanche, rougissant faiblement par endroits à la coupe, bleuissant un peu au-dessus des tubes
Odeur:	légèrement fruitée, forte, parfois de goudron, parfois forte de chlore à la base du pied
Saveur:	âcre
Habitat:	juillet-novembre, bois de feuillus et de résineux, sur sol acide.Assez rare. Seul ou en groupe, souvent sur litière épaisse
Remarques:	comestible au goût déplaisant a été dans certains cas signalé comme toxique
Confusion:	Bolet rude (Leccinum scabrum) *certains bolets granuleux, mais ces derniers ont les pores plus clairs noircissants mais ne virant jamais au bleu au toucher, et leurs pied est recouvert de petites mèches granuleuses*
Classification:	Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae > Boletales > Boletaceae > Tylopilus

Photos:



Photos micro: