

Cortinaire odorifère



Comestible

Recommandation officielle:  **TOXIQUE**

Nom latin: Cortinarius odorifer

Famille: A lames > Cortinariaceae > Cortinarius > Phlegmacium

Caractéristiques du genre Phlegmacium : chapeau: trapu, visqueux (rarement sec), non hygrophane - lames: adnées, trame régulière, jaunes, olive, violettes ou brun-roux - pied: épais, souvent bulbeux, sec, avec cortine double (au bord du bulbe et en haut) - remarques: mycorrhizien, les espèces jaune vif sont toxiques ou suspectes

Synonymes: Phlegmacium odorifer

Chapeau: 4-8cm, convexe puis hémisphérique, très visqueux, jaune verdâtre à verdâtre, rougeâtre un peu plus foncé au centre, presque jusqu'à la marge avec l'âge

Lamelles: adnées, serrées, jaunes, vite jaune verdâtre à jaune olive

Pied: sans anneau, avec une cortine, bulbeux-marginé, vert jaunâtre, un peu rougeâtre vers la base

Chair: jaune citrin à jaune olive au-dessus des lames, jaune verdâtre ailleurs dans le chapeau et le pied

Odeur: odeur anisée dans les lames, rappelant Clitocybe odora

Saveur: douce

Habitat: septembre-novembre, sur sol mal drainé sous vieux conifères, thuyas, chênes et quelques bouleaux

Remarques: Attention aux cortinaires à chair jaune. Le cortinaire odorifère est l'un des rares cortinaires à chair jaune comestible. Lors du séchage des spécimens, une très bonne odeur se dégage, composée de popcorn sucré et de miel anisé

Confusion: Cortinaire élégant (Cortinarius elegantissimus)

odeur

Cortinaire resplendissant, Cortinaire éclatant (Cortinarius splendens)

Et les autres Cortinaires à chair jaune.

Un très grande majorité des Cortinaires à chair jaune sont (très) toxiques, voire mortels.

Cortinaire vert foncé, Cortinaire vert sombre (Cortinarius atrovirens)

différente odeur

Cortinarius subturbinatus (Cortinarius subturbinatus)

odeur

Conservation: Congélation - Séchage - Poudre

Détermination: Carpophore > Lamelles sous le chapeau > Lames minces véritables > Chair élastique ou molle, du moins dans le chapeau > Sporée non blanche > Sporée ni noire ni blanche > Sporée brun ou rouille > Pied central > Lamelles adhérentes au chapeau > Chapeau non sphérique, non ocre givré et non ridé à la base > Pas sur fumier > A terre, pas en touffes > Chapeau non capanulé ou lamelles non grises > Lamelles rouillé ferrugineux à maturité, cortine > Chapeau visqueux > Pied non visqueux > Pied bulbeux, sans marge, massif > Phlegmacium

Classification: Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae > Agaricales > Cortinariaceae > Phlegmacium

Photos:



