

Polypore soufré



Comestible

Recommandation officielle:



COMESTIBLE

Nom latin: *Laetiporus sulphureus*

Famille: *A tubes > Polyporaceae > Polyporus*

Caractéristiques du genre *Polyporus* : chapeau: coriace, élastique, sec, feutré à écailleux - lames: tubes en couches minces - pied: central ou excentrique - remarques: lignicole, saprophyte, plus rarement parasite, provoque une pourriture blanche

- Synonymes:** *Laetiporus cincinnatus*, *Cladoporus sulphureus*, *Laetiporus sulphureus* f. *ramosus*, *Grifola sulphurea*, *Tyromyces sulphureus*, *Polyporellus caudicinus*, *Polypilus caudicinus*, *Leptoporus casearius*, *Leptoporus ramosus*, *Leptoporus sulphureus*, *Polyporus candicinus*, *Polyporus caudicinus*, *Cladomeris casearius*, *Cladomeris sulphurea*, *Polyporus cincinnatus*, *Polypilus casearius*, *Polypilus sulphureus*, *Polyporellus rubricus*, *Merisma sulphureum*, *Merisma sulphureus*, *Stereum speciosum*, *Polyporus todari*, *Polyporus ceratoniae*, *Polyporus rubricus*, *Polyporus casearius*, *Cladoporus fulvus*, *Polyporus citrinus*, *Polyporus ramosus*, *Polyporus sulphureus*, *Cladoporus ramosus*, *Sistotrema sulphureum*, *Agarico-carnis flammula*, *Agarico-pulpa styptica*, *Boletus lingua-cervina*, *Boletus ramosus*, *Boletus sulphureus*, *Boletus tenax*, *Boletus caudicinus*
- Chapeau:** 10-40 cm, jaune-soufre à orangé-vif, palissant avec l'âge pour finir au blanc-sale ou fauve. Il est constitué de plusieurs couches superposées d'une épaisseur de 5 à 15 cm chacune. En forme d'éventail, à bord ondulé, très fragile et cassant en vieillissant. Marge irrégulière, incurvée, ondulante, jaune soufre
- Lamelles:** néant. Tubes jaunes, réguliers et courts
- Pied:** sans anneau, base épaisse située dans le prolongement du carpophore sur laquelle viennent souvent s'imbriquer plusieurs individus
- Chair:** jaunâtre, épaisse, molle, humide à la pression des doigts puis en séchant elle devient fragile et cassante. Dure, raide, cassante, pâle sur les vieux sujets
- Odeur:** légèrement piquante, rappelant la chair de poulet sur les jeunes exemplaires, devenant plutôt fongique en vieillissant
- Saveur:** acidulée
- Habitat:** avril-novembre, troncs des feuillus qu'il parasite à la faveur d'une blessure et condamne à une mort lente. Souvent les arbres parasités gardent une apparente bonne santé pour s'écrouler brusquement, vidés de leur substance. Essentiellement sur troncs abattus, souches et branches diverses des bois de feuillus, surtout de chênes et châtaigniers. Commun
- Remarques:** Confusion impossible en raison des couleurs vives mais aussi peu probable si le spécimen est blanchâtre.
Certains le disent comestible, en Amérique il est appelé "Poulet des bois" (wood chicken) à cause de sa chair et de sa saveur rappelant le poulet. Il peut provoquer des réactions allergiques chez certains consommateurs.
- Confusion:** Polypore de Schweinitz, Phéole de Schweinitz (*Phaeolus spadiceus*)
pousse contre les troncs et pas au sol
- Détermination:** Carpophore > Tubes ou pores sous le chapeau > Chaire dure ou pied non central (Polypores) > Sur bois > Chapeaux simples > Ne dépassant pas le support de plus de 15 cm > Pied central et grêle > Chapeau écailleux > *Polyporus*
- Classification:** Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Polyporales > Fomitopsidaceae > *Laetiporus*

Photos:





Photos micro:

