

Trémelle gélatineuse, Trémellon gélatineux



Comestible, sans valeur Recommandation officielle:



COMESTIBLE

Nom latin: Pseudohydnum gelatinosum

Famille: Autres > Tremellaceae > Tremella

Caractéristiques du genre Tremella : chapeau: lobé, en masse plus ou moins tuberculeuse, gélatineuse, rarement avec noyau ferme, corné en séchant, face externe avec couche fertile - lames: inexistantes - pied: inexistant - remarques: saprophyte sur le bois, provoque une pourriture blanche, rarement parasite sur d'autres champignons

Synonymes: Tremellodon auriculatum, Tremellodon auriculatus, Tremellodon gelatinosum, Tremellodon gelatinosus, Hydnogloea gelatinosa, Exidia gelatinosa, Hydnum auriculatum, Steccherinum gelatinosum, Hydnum clandestinum, Hydnum gelatinosum

Chapeau: 3-7cm, convexe étalé à étalé difforme, linguiforme ou en éventail, à marge fine et un peu onduleuse, à cuticule lisse à finement ruguleuse ou pubescente voire parfois hérissée de minuscules petites pointes, de couleur brun grisâtre pâle, brun fauvâtre pâle ou ochracé pâle plus ou moins translucide, plus rarement blanchâtre

Lamelles: néant: aiguillons épais et assez serrés, de consistance gélatineuse, de couleur blanche, débordant parfois jusque sur la marge

Pied: sans anneau, pied inexistant ou très court et latéral, translucide et de même couleur à un peu plus foncé que l'hyménium

Chair: blanchâtre translucide, gélatineuse à caoutchouteuse

Odeur: nulle à faible mais non caractéristique

Saveur: résineuse

Habitat: août-novembre, essentiellement sur le bois pourri, les troncs et surtout les souches de conifères, principalement en petites troupes de quelques individus plus ou moins imbriqués mais parfois aussi isolément. Lieux bien humides et froids, assez commun par endroit.

Remarques: sa consistance molle et son petit goût de résine assez particulier ne l'empêchent pas d'être comestible mais de qualité assez médiocre. Peut être mangé en salade (avec une sauce bien relevée) après avoir été blanchi.

Confusion: peu de risque de confusion avec des champignons que l'on trouve en Suisse romande.

Détermination: Carpophore > Ni lamelles, ni tubes, ni pores, ni aiguillons sous le chapeau > Entièrement à l'air libre à maturité > Non étalé sur le bois sous forme de croûte > Ni l'aspect d'une croûte, ni la forme d'un dé à coudre > Pas l'aspect de petites masses hémisphériques > Forme d'origine pas sphérique > Chair non cassante comme de la cire ou champignon dressé avec tige en massue ou en branches ramifiées > Pas en forme de trompette, ni de cornet > Chair non cassante, souple ou gélatineuse, cartilagineuse > Tronc ramifié > Rameaux aplatis, en lanières ou difformes > Rameaux contournés, ocracés à jaunâtres > Sur bois, masse de feuilletts gélatineuse, petite taille > Tremella

Classification: Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Auriculariomycetidae > Auriculariales > Exidiaceae > Tremellodon

Photos:





Photos micro:

