

Lactaire pubescent



Comestible, sans valeur Recommandation officielle:



NON COMESTIBLE

Nom latin: Lactarius pubescens

Famille: A lames > Russulaceae > Lactarius

Caractéristiques du genre Lactarius : chapeau: fragile, exudant un lait à la cassure, nu à velu, sec ou poisseux, cernes concentriques fréquents - lames: fragiles - pied: cylindrique, vite creux - remarques: mycorrhizien, on peut goûter de petits morceaux pour la détermination

Synonymes: Lactarius torminosus var. pubescens, Lactarius torminosus subsp. pubescens, Lactarius controversus var. pubescens

Chapeau: 6-10 cm, plan-convexe plus ou moins déprimé en entonnoir, charnu, marge fortement enroulée chez le jeune et finement barbue, laineuse, excédante, cuticule séparable jusqu'à mi-rayon, laineuse ouateuse par temps sec, grasse et visqueuse à l'humide, blanchâtre, non zonée au sec, à peine marquée de zones peu distinctes et lavée de rose surtout au disque à l'humide. Vieux exemplaires étalés, déprimés en entonnoirs, souvent de couleur beige carné sale

Lamelles: adnées décurrentes, serrées, minces, plutôt étroites, rarement fourchues, nombreuses lamelles et lamellules, blanc crème puis rosées très pâles, arête aiguë, entière, concolore

Pied: sans anneau, court et trapu, un peu farci, atténué en bas, concolore au chapeau parfois décoré de quelques scrobicules, bien souvent présence d'une bande rose à l'apex, lisse, soyeux, blanchâtre, un peu taché de brunâtre avec l'âge, souvent avec mycélium basal blanc

Chair: blanchâtre à reflets rose orangé, fragile, lait peu abondant, blanc immuable sur le champignon mais jaunissant assez fort sur le coton

Odeur: acidulée, légèrement fruitée, aromatique, faible

Saveur: âcre

Habitat: août-octobre, pelouses herbeuses urbaines, sur sol calcaire, en relation directe avec les bouleaux, en troupe de quelques individus moyennement serrés sur quelques mètres carrés

Remarques: Son âcreté fait de lui un champignon qui n'est pas pour la table

Confusion: Agaric des prés, champêtre, Rosé des prés (*Agaricus campestris*)

la couleur rose des lames le différencie

Lactaire à lait abondant, vachotte, vachette (*Lactarius volemus*)

lait moins abondant

Lactaire des sphaignes (*Lactarius sphagneti*)

ne pousse pas dans les mêmes milieux

Lactaire poivré (*Lactarius piperatus*)

de taille plus imposante

Détermination: Carpophore > Lamelles sous le chapeau > Lames minces véritables > Chair cassante comme de la craie > Avec lait (latex) qui s'écoule à la cassure > Lactarius

Classification: Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Russulales > Russulaceae > Lactarius > Lactarius torminosus

Photos:



