

Hydne scrobiculé



Comestible, sans valeur Recommandation officielle:



NON COMESTIBLE

Nom latin: *Hydnellum scrobiculatum*

Famille: A aiguillons > Thelephoraceae > *Hydnellum*

Caractéristiques du genre *Hydnellum* : chapeau: pédonculé, aiguillons sur la face inférieure du chapeau, chair liégeuse, zonée, odeur souvent farineuse (à la coupure) - lames: aiguillons brunâtres à maturité - pied: court - remarques: saprophyte, terrestre

- Synonymes:** *Hydnellum velutinum* var. *scrobiculatum*, *Phaeodon scrobiculatus*, *Hydnum ferruginealbum*, *Hydnum testaceofulvum*, *Hydnum sanguineofulvum*, *Calodon scrobiculatus*, *Hydnum scrobiculatum*
- Chapeau:** 3-10cm, obconique à légèrement turbiné, irrégulièrement arrondi à lobé, puis étalé à profondément déprimé à ombiliqué, parfois avec ébauches de chapeaux au-dessus et souvent conrescent à plusieurs autres, tomenteux à feutré au début et à la marge en croissance active, glabrescent, irrégulier, scrobiculé à alvéolé au disque, avec projections cornées ou épines trapues et grosses écailles dressées au centre, souvent ridé-rugueux radialement avec l'âge, costulé, faiblement zoné, mat, blanchâtre à brun rose terne au début, brun chamois, orange rougeâtre, brun rougeâtre, cannelle rouille foncé, brun pourpré à brun noirâtre avec l'âge, zoné et devenant noire au froissement vers la marge, exsudant parfois des gouttelettes rouge foncé à l'humidité et au début, devenant noir rougeâtre au froissement, à marge enroulée, sinueuse, crénelée à fimbriée, parfois lobée, agglomérant souvent des débris végétaux
- Lamelles:** néant, aiguillons densément serrés, souvent decurrents, parfois fusionnés, inégaux, très fins, fragiles, blanchâtres au début, brun chamois, brun cannelle, orange rougeâtre à brun-rouge avec l'âge, pourprés à brun foncé à la fin, 1-5mm de longueur
- Pied:** centré à excentré, égal, élargi à souvent atténué vers la base ou bulbeux, radicant, irrégulier, souvent spongieux à la base, velouté-feutré, fibrilleux par endroits, concolore au chapeau à brun cannelle, arrivant d'un feutrage mycélien concolore au chapeau, parsemé de débris de substrats
- Chair:** élastique au frais, ligneux et dur au sec, duplexe, surtout près du pied, avec couche supérieure spongieuse au frais et concolore au chapeau, et couche inférieure subéreuse, brun orangé, roux grisâtre à brun rougeâtre foncé, zoné concentriquement, parfois avec taches allongées blanchâtres, exsudant souvent un liquide rouge foncé à la pression à l'humidité
- Odeur:** faible, douce, farineuse, épicée
- Saveur:** faible, farine
- Habitat:** août-octobre, conifères ou dans les forêts mixtes, solitaire, dispersé ou grégaire
- Remarques:** difficile à caractériser, se reconnaît par son chapeau très accidenté, irrégulier-rugueux, scrobiculé ridé radialement et avec projections épineuses
- Confusion:** *Hydne tomenteux* (*Phellodon tomentosus*)
Plus grand
Hydnelle de Peck (*Hydnellum peckii*)
- Détermination:** Carpophore > Aiguillons sous le chapeau > Champignon à chair ferme > Pas en forme de touffe > Chapeaux imbriqués, chair ligneuse > Pas d'odeur de bouillon de viande > *Hydnellum*
- Classification:** Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Thelephorales > Bankeraceae > *Hydnellum* > *Hydnellum velutinum*

Photos:



