

Psathyrelle ridée, Psathyrelle micacée, Psathyrelle gracile



Comestible, sans valeur

Recommandation officielle:



NON COMESTIBLE

Nom latin: Psathyrella gracilis

Famille: A lames > Cortinariaceae > Cortinarius > Psathyrella

Caractéristiques du genre Psathyrella : chapeau: fragile, sec, généralement hygrophane, écailleux floconneux ou nu, non sillonné et non déliquescent - lames: adnées, trame régulière, non déliquescentes - pied: épais à mince, nu à floconneux, parfois radicant, généralement sans anneau - remarques: saprophyte sur la terre, le bois et le fumier

Synonymes: Hypholoma gracile, Psathyrella corrugis f. gracilis, Psathyra gracilis, Fungus diffusus, Drosophila gracilis, Coprinarius gracilis, Agaricus gracilis, Prunulus gracilis

Chapeau: 2-5cm, conique-obtus puis largement campanulé, convexe à subétalé, demeurant parfois conique-obtus, glabre, lisse, inégal, souvent ruguleux avec l'âge et au sec, viscidule au début, hygrophane, chamois pâle, argilacé à chamois cannelle, graduellement pâle puis gris plomb, souvent teinté de rosâtre à brun jaunâtre avec l'âge, au moins vers le pourtour, crème rosé à blanchâtre et souvent teinté de chamois au disque au sec, à marge apprimée contre le pied au début, translucide-striée à l'humidité, souvent crénelée, striée-sillonnée ou parfois dentelée avec l'âge

Lamelles: adnées à uncinées, ascendantes ou horizontales, modérément larges, 4-6 mm, avec lamellules, serrées, crème à pâles puis brunes à brun-pourpre terne, parfois teintées de rose, à arêtes entières, parfois teintées de rose

Pied: égal, souvent radicant, droit, fragile, creux, légèrement sans anneau, pruineux à fibrilleux-pruineux vers l'apex, lisse, parfois strié longitudinalement, glabre à très légèrement fibrilleux vers la base, vite glabrescent, blanc terne, souvent strigieux à la base

Chair: très mince, vite fragile, concolore à la surface du chapeau ou plus pâle

Odeur: neutre

Saveur: douce

Habitat: juin-octobre, sol et débris ligneux des forêts de feuillus, souvent en milieux herbeux, dispersé ou grégaire, occasionnel

Remarques:

Confusion: Collybie des cônes (*Strobilurus stephanocystis*)

Détermination: Carpophore > Lamelles sous le chapeau > Lames minces véritables > Chair élastique ou molle, du moins dans le chapeau > Sporée non blanche > Sporée noire > Lamelles non déliquescentes > Lamelles non roses sur les jeunes > Lamelles non décurrentes > Cortine légère > Chapeau hygrophane et fragile > Chapeau généralement floconneux, lamelles unies > Psathyrella

Classification: Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae > Agaricales > Strophariaceae > Hypholoma

Photos:

