Hydne violet

Comestible, sans valeur **Recommandation officielle:** NON COMESTIBLE

Nom latin: Sarcodon joeides

Famille: A aiguillons > Thelephoraceae > Sarcodon

Caract?ristiques du genre Sarcodon : chapeau: face inférieure du chapeau couverte d'aiguillons gris à brunâtres - lames: aiguillons gris à brunâtres - pied: central à excentrique - remarques: mycorrhizien

Synonymes:	Hydnum commutatum, Hydnum inopinatum, Hydnum roseolum
Chapeau:	3-11cm, convexe à convexe-étalé puis étalé, déprimé au centre à profondément concave, sinueux, irrégulièrement arrondi, velouté au début, puis finement fibrilleux-squamuleux, souvent légèrement crevassé avec l'âge, chamois, brun ocre à brun-rose, beige rougeâtre, brun-rouge avec l'âge, à marge incurvée au début, puis ondulée et incisée
Lamelles:	néant, aiguillons profondément, mais irrégulièrement décurrents, subulées, serrés, brun-rose au début, pourpre brunâtre à brun chocolaté avec l'âge, avec la pointe blanche
Pied:	sans anneau, parfois excentré, simple ou conné, égal à conique, atténué vers la base, arrondi, presque radicant, plein, velouté puis fibrilleux longitudinalement ou glabrescent, ponctué à finement squamuleux brun-pourpre, vert sombre vers la base, cotonneux blanc à la base
Chair:	compacte, cassante, non zonée, devenant immédiatement rose pâle à lilas à la coupe, puis violet sombre
Odeur:	farineuse au frais, de fenugrec au sec
Saveur:	amarescente à âcre
Habitat:	août-octobre, sol des forêts de feuillus, sous châtainier et chêne, souvent fasciculé, rarement solitaire, rare
Remarques:	contrairement à son cousin l'Epervier, il n'est pas comestible car très âcre
Confusion:	Epervier, Hydne imbriqué, Ecailleux, Sarcodon imbriqué (Sarcodon imbricatus)
Détermination:	Carpophore > Aiguillons sous le chapeau > Champignon à chair ferme > Pas en forme de touffe > Chapeau unique > Chapeau écailleux, brunâtre > Sarcodon
Classification:	Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Cantharellales > Hydnaceae > Hydnum

Photos: