

Mycène des cônes d'épicéa



Toxique

Recommandation officielle:



NON COMESTIBLE

Nom latin: *Mycena plumipes*




Famille: A lames > Tricholomataceae > *Mycena*

Caractéristiques du genre *Mycena* : chapeau: hémisphérique, cônique en cloche, rarement ombiliqué, généralement sec, hygrophane, humide strié par transparence, cuticule fine - lames: adnées, trame régulière, adhérentes à décurrentes, arête partiellement d'une couleur différente - pied: mince, généralement cassant, creux, parfois avec du lait - remarques: saprophyte terrestre ou sur débris de bois mort

- Synonymes:** *Mycena plumipes* var. *plumipes*, *Collybia plumipes*, *Agaricus plumipes*
- Chapeau:** 1.5-3.5 cm, ovoïde, campanulé à conique à l'état jeune, aplani à maturité, brunâtre-ochracé
- Lamelles:** assez larges, blanches à gris blanchâtre, souvent teintées de rose avec l'âge
- Pied:** sans anneau, creux, cassant, lisse, brun gris à brun clair, pâle et poudré de blanc au sommet, feutré de blanc ou hirsute à la base
- Chair:** mince, blanchâtre
- Odeur:** eau de javel
- Saveur:** douce, légèrement raphanoïde
- Habitat:** mars-mai, sur cônes d'épicéa enfouis
- Remarques:** Aussi appelée *Mycena strobilicola*. Version toxique de la Collybie des cônes d'épicéa
- Confusion:** Collybie des cônes d'épicéa (*Strobilurus esculentus*)
Mycena plumipes sent l'eau de javel, ce que ne fait pas la Collybie des cônes d'épicéa
- Toxicité?:** Syndrome: gastro-intestinal (= résinoïdien) - Poison: Chitine, tréhalose, mannitol, etc.
Symptômes: Latence: 3-6 heures, puis nausées, des vomissements, des douleurs gastriques et des diarrhées.
Remarques: Ce syndrome provoque essentiellement des nausées, des vomissements, des douleurs gastriques et des diarrhées. Ce syndrome peut être provoqué par une multitude d'espèces de champignons et par diverses causes. Les champignons comestibles mangés en trop grandes quantités peuvent provoquer ce syndrome car les champignons contiennent des molécules peu digestes (chitine) et/ou uniques aux champignons (tréhalose, mannitol). Les personnes ayant un déficit en tréhalase (enzyme qui dégrade le tréhalose) peuvent avoir des diarrhées. Certaines espèces, dans certains cas, peuvent être toxiques: *Armillaria* sp., *Lepista* sp., *Agaricus xanthoderma* (Agaric jaunissant)
- Détermination:** Carpophore > Lamelles sous le chapeau > Lames minces véritables > Chair élastique ou molle, du moins dans le chapeau > Sporée blanche > Pas de volve > Pied central > Lamelles minces ou à consistance non cireuse > Lamelles non libres > Lamelles adnées ou échancrées > Chapeau moins de 4 cm > Sans anneau > Pied grêle et fragile > Lamelles ni espacées ni rose vif ni violettes > *Mycena*
- Classification:** Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae > Agaricales > Mycenaceae > *Mycena* > *Mycena plumipes*

Photos:







Photos micro:

