

Hydne odorant, Hydne bleu d'azur



Comestible, sans valeur Recommandation officielle:



NON COMESTIBLE

Nom latin: *Hydnellum caeruleum*

Famille: A aiguillons > Thelephoraceae > *Hydnellum*

Caractéristiques du genre *Hydnellum* : chapeau: pédonculé, aiguillons sur la face inférieure du chapeau, chair liégeuse, zonée, odeur souvent farnieuse (à la coupure) - lames: aiguillons brunâtres à maturité - pied: court - remarques: saprophyte, terrestre

- Synonymes:** *Hydnellum alachuanum*, *Calodon cyaneotinctus*, *Calodon ferrugipes*, *Hydnum alachuanum*, *Sarcodon alachuanus*, *Hydnum inquinatum*, *Hydnellum ferrugipes*, *Hydnellum inquinatum*, *Hydnellum cyaneotinctum*, *Hydnum cyaneotinctum*, *Hydnum fulvocaeruleum*, *Hydnum fulvocoeruleum*, *Calodon caeruleus*, *Hydnellum coeruleum*, *Hydnum suaveolens* var. *caeruleum*, *Hydnum caeruleum*
- Chapeau:** 3-11 cm, conique à convexe puis étalé, déprimé chez les vieux sujets, lobé, velouté à tomenteux-cotonneux puis feutré à glabre vers le disque, souvent légèrement bosselé à alvéolé, entièrement blanchâtre au début, puis blanc jaunâtre, jaune pastel, blond foncé à brun pâle, vite teinté de bleu, souvent entièrement bleu, graduellement brun au centre, devenant violet grisâtre à bleu noirâtre au froissement
- Lamelles:** sans lame, aiguillons décurrents, très serrés, blanchâtres au début, puis blanc orangé à bruns avec la pointe plus pâle à maturité
- Pied:** sans anneau, centré, élargi à atténué vers la base, comprimé, typiquement subbulbeux, feutré à glabre vers l'apex, entouré d'un manchon tomenteux brun foncé vers la base, brun pâle, orange grisâtre à rougeâtre doré
- Chair:** coriace, zoné en alternance de bleu et d'orangé, duplexe, spongieux sous la surface, dur au centre, zoné et concolore dans le pied
- Odeur:** faible d'épice, ou forte de lavande, d'anis ou de menthe selon la variante *suaveolens*
- Saveur:** désagréable, douce
- Habitat:** août-octobre, mycorhizique, sur sol des forêts de conifères, grégaire, parfois fusionné à d'autres
- Remarques:** seul *Hydnellum* qui a des zones bleuâtres. Odeur très marquée pour la variante *suaveolens*
- Confusion:** *Hydnelle de Peck* (*Hydnellum peckii*)
L'hydne de Peck a un jus rouge, ce que n'a pas l'Hydne bleu
- Détermination:** Carpophore > Aiguillons sous le chapeau > Champignon à chair ferme > Pas en forme de touffe > Chapeaux imbriqués, chair ligneuse > Pas d'odeur de bouillon de viande > *Hydnellum*
- Classification:** Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Thelephorales > Bankeraceae > *Hydnellum*

Photos:

