

Clitocybe orangé, fausse Chanterelle orangée



Comestible

Recommandation officielle:



NON COMESTIBLE

Nom latin: *Hygrophoropsis aurantiaca*

Famille: A lames > *Hygrophorataceae* > *Hygrophorus*

Caractéristiques du genre *Hygrophorus* : chapeau: souvent poisseux, généralement nu - lames: adnées, épaisses, souvent espacées, , adhérentes à décurrentes, trame bilatérale - pied: épais à mince, visqueux ou sec, sans anneau, rarement avec zone annulaire visqueuse - remarques: mycorrhizien

Synonymes: Chanterel alectorolophoides, *Clitocybe aurantiaca*, *Merulius brachypodes*, *Merulius brachypodis*, *Cantharellus ravenelii*, *Cantharellus brachypodus*, *Cantharellus aurantiacus*, *Agaricus subcantharellus*, *Merulius alectorolophoides*, *Merulius aurantiacus*, *Agaricus alectorolophoides*

Chapeau: 3-10 cm, convexe puis étalé et déprimé en entonnoir, marge fine, largement enroulée, feutrée, plus claire que le centre, cuticule séparable, fragile, sèche, jamais grasse, finement feutrée, d'une couleur pouvant aller du jaune pâle à l'orange vif

Lamelles: peu larges, assez serrées, épaisses, très décurrentes, flasques, faciles à séparer, fourchues, de jaune pâle à orange vif parfois presque rouges dans l'âge

Pied: centré à excentré, subégal ou élargi vers la base, souvent courbe, grêle, mou-fibreux, plein, farci puis creux, glabre, fibrilleux-strié ou finement velouté à subtomenteux, sec, jaunâtre, orangé, brun orangé, ochracé à bistré, fuligineux avec l'âge, surtout vers la base

Chair: épaisse au centre, mince vers la marge, molle, cotonneuse-floconneuse, blanchâtre, jaunâtre, orangée ou concolore à la surface du chapeau

Odeur: douce, fongique

Saveur: douce, amarescente

Habitat: août-octobre, solitaire, dispersé à grégaire, près ou sur bois pourri, souvent de conifères

Remarques: À cause de ses lames fourchues et de sa couleur orangée, elle passe parfois pour une chanterelle. Cette dernière diffère par sa couleur jaune d'oeuf, ses plis lamelliformes à maturité et son odeur fruitée. La confusion ne porte pas à conséquence.

Confusion: Chanterelle, Girolle (*Cantharellus cibarius*)
La chanterelle a des plis, le Clitocybe orangé a des lames.
Attention à la confusion avec le clitocybe de l'olivier (pas présent en Suisse) qui est très toxique.

Conservation: Séchage - Poudre

Détermination: Carpophore > Lamelles sous le chapeau > Lames minces véritables > Chair élastique ou molle, du moins dans le chapeau > Sporée blanche > Pas de volve > Pied central > Lamelles assez épaisses, espacées, molles, consistance cireuse > Chapeau non blanc ou visqueux > Chapeau terne ou sombre, ou blanc et visqueux > *Hygrophorus*

Classification: Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae > Boletales > *Hygrophoropsidaceae* > *Hygrophoropsis*

Photos:







Photos micro:

