

Collybie beurrée var. asema



Comestible, sans valeur



NON COMESTIBLE

Nom latin: *Collybia butyracea* var. *asema*

Famille: *A lames > Tricholomataceae > Collybia*

Caractéristiques du genre *Collybia* : chapeau: taille moyenne, en partie hygrophane, cuticule sèche - lames: adnées, trame régulière, blanches à brunâtre, adhérentes à adnées - pied: épais à mince, cannelé, nu ou floconneux - remarques: saprophyte, voir également *Microcollybia*

Synonymes: *Rhodocollybia butyracea* f. *asema*, *Collybia butyracea* f. *asema*, *Marasmius asemus*, *Collybia asema*, *Agaricus asemus*, *Agaricus leucophyllus* var. *asemus*

Chapeau: 5-9cm, convexe à marge incurvée puis s'aplatissant à marge lisse striée par transparence et se creusant parfois légèrement en coupe, cuticule très lisse, grasse au toucher, comme beurrée, pâlisant au sec en beige pâle par zones, à partir de la marge, marge fine, plus claire, légèrement striée, hygrophane de couleur crème grisâtre à beige brunâtre, s'éclaircissant vers la marge, à mamelon ochracé, de couleur générale pouvant aller jusqu'au blanchâtre lorsqu'il fait sec, parfois zoné de blanchâtre à crème entre le disque et la marge

Lamelles: échancrées et serrées, à arête crénelée, de couleur blanche puis devenant crème pâle

Pied: sans anneau, creux, cylindrique, en forme de massue quand il est court, bulbeux, plus étroit vers le sommet et s'épaississant vers la base (clavé), très finement fribillo-strié, de couleur généralement crème à crème grisâtre parfois plus foncé vers le sommet et/ou vers la base, cotonneux blanc dans la partie enterrée

Chair: élastique, blanchâtre à brun clair, peu épaisse, cartilagineuse dans le stipe

Odeur: faible, parfois de rance

Saveur: neutre

Habitat: juin-novembre, bois de feuillus mais aussi de conifères, appréciant la litière des feuilles et l'humus, saprophyte à tendances acidophiles, en troupes parfois de nombreux individus

Remarques: très fréquent selon les régions. Comestible mais médiocre, retirer le pied qui est coriace

Confusion: *Collybie beurrée*, *Collybia butyracea* (*Rhodocollybia butyracea*)
coloration différente

Détermination: Carpophore > Lamelles sous le chapeau > Lames minces véritables > Chair élastique ou molle, du moins dans le chapeau > Sporée blanche > Pas de volve > Pied central > Lamelles minces ou à consistance non cireuse > Lamelles non libres > Lamelles adnées ou échancrées > Chapeau moins de 4 cm > Sans anneau > Pied grêle et tenace, résistant à la torsion > Pas sur cône de résineux > Pied souple à la pression des doigts > *Collybia*

Détermination: Carpophore > Lamelles sous le chapeau > Lames minces véritables > Chair élastique ou molle, du moins dans le chapeau > Sporée blanche > Pas de volve > Pied central > Lamelles minces ou à consistance non cireuse > Lamelles non libres > Lamelles adnées ou échancrées > Chapeau plus de 4 cm > Pied cartilagineux > Pied pas noir ni velouté à la base > Pas de cordon mycélien à la base du pied ou chapeau sec > *Collybia*

Classification: Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae > Agaricales > Omphalotaceae > *Rhodocollybia* > *Rhodocollybia butyracea*

Photos:





