

Tramète cinabre



Comestible, sans valeur



NON COMESTIBLE

Nom latin: Pycnoporus cinnabarinus

Famille: A tubes > Coriolaceae

Caractéristiques du genre Coriolaceae : chapeau: - lames: - pied: - remarques:

- Synonymes:** Fabisporus cinnabarinus, Coriolus cinnabarinus, Hapalopilus cinnabarinus, Phellinus cinnabarinus, Leptoporus cinnabarinus, Polystictus cinnabarinus, Trametes cinnabarina, Trametes cinnabarinus, Polyporus cinnabarinus, Polyporus cinnabarrinus, Boletus cinnabarinus
- Chapeau:** 7x15x4cm, dimidié à allongé, réniforme ou en forme de console à contour souvent irrégulier, à surface bosselée et à marge aigue, à cuticule veloutée à l'état juvénile, glabre, azoné, saumon ochracé à orange abricot, couleur orange très vive, presque fluo, puis plus pâle avec l'âge ou noircissant
- Lamelles:** sans lames, tubes rouge orangé à rouge corail, rouge plus longtemps que le chapeau, pores ronds à anguleux, 3-4 par mm, à dissépinements tomenteux, épais, puis parfois minces et lacérés, couche de tubes orange rougeâtre à jaunâtre au sec, jusqu'à 6 mm de longueur
- Pied:** sans pied, sans anneau, en console
- Chair:** molle, fibreuse à subéreuse coriace en vieillissant, zoné, rouge à orange pâle, jusqu'à 1.5cm d'épaisseur
- Odeur:** neutre, fongique
- Saveur:** neutre
- Habitat:** juin-octobre, saprotrophe, généralement en petits groupes de quelques individus mais parfois aussi isolément, sur bois mort de feuillus, rarement de conifères, sur souches pourries et carbonisées, agent de carie blanche
- Remarques:** Relativement rare, ne peut être confondu vu sa couleur
- Confusion:** peu de risque de confusion avec des champignons que l'on trouve en Suisse romande.
- Classification:** Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Polyporales > Polyporaceae > Fabisporus

Photos:



