

Amanite à volve grise



Comestible, sans valeur Recommandation officielle:



COMESTIBLE

Nom latin: Amanita submembranacea

Famille: A lames > Amanitaceae > Amanitopsis

Caractéristiques du genre Amanitopsis : chapeau: marge nettement striée - lames: adnées, blanches, rarement jaunes, trame régulière - pied: épais, sans anneau, avec reste de voile (bourrelet), bulbe généralement mince, profondément enfoncé - remarques: aucune espèce très toxique

- Synonymes:** Amanitopsis submembranacea, Amanita submembranacea var. submembranacea
- Chapeau:** 6-10cm, convexe puis plan, brun olivâtre, strié presque jusqu'au milieu, souvent orné de débris gris-blanchâtre, marge aiguë, striée, plus pâle, lisse et brillant, orné d'une ou de plusieurs plaques grisâtres. Marge longuement striée-cannelée, non franchement zonée à la limite des stries
- Lamelles:** larges, assez serrées, libres, blanches puis crèmes, arêtes floconneuses, larges
- Pied:** sans anneau, creux, cassant, renflé à la base, blanchâtre, légèrement chiné de bistre olivacé en bas, volve bien formée, peu fragile, grise à brun-gris
- Chair:** blanche, immuable, épaisse au centre du chapeau
- Odeur:** neutre
- Saveur:** douce, noisette
- Habitat:** juillet-septembre, Conifères de montagne, sur sol acide
- Remarques:** Comestible sans valeur. Comme (presque) toutes les Amanites comestibles, à cuire ou sécher avant consommation
- Confusion:** Amanite dorée (*Amanita ceciliae*)
taille plus modeste et volve non pulvérulente
Amanite fauve (*Amanita fulva*)
couleur de la volve
- Détermination:** Carpophore > Lamelles sous le chapeau > Lames minces véritables > Chair élastique ou molle, du moins dans le chapeau > Sporée blanche > Avec volve parfois friable > Sans anneau > Amanitopsis
- Classification:** Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae > Agaricales > Amanitaceae > Amanita

Photos:





