

Polypore hérissé



Comestible, sans valeur Recommandation officielle:



NON COMESTIBLE

Nom latin: Jahnporus hirtus

Famille: A tubes > Polyporaceae > Polyporus

Caractéristiques du genre Polyporus : chapeau: coriace, élastique, sec, feutré à écailleux - lames: tubes en couches minces - pied: central ou excentrique - remarques: lignicole, saprophyte, plus rarement parasite, provoque une pourriture blanche

- Synonymes:** Polyporus luciengueletii, Albatrellus hirtus, Piptoporus hirtus, Polyporellus hirtus, Scutiger hispidellus, Leucoporus hirtus, Polyporus hispidellus, Cerioporus hirtus, Fomes hirtus
- Chapeau:** 10-20cm, circulaire, hispide, pelliculeux à tomenteux au début, hispide à verruqueux, azoné, gris brunâtre, brun rougeâtre à brun pourpré pâle, à marge assez obtuse, droite à légèrement ondulée, concolore
- Lamelles:** sans lames, face poreuse blanche à crème, pores anguleux, 1-2 par mm, à dissépinements minces à lacérés, couche de tubes concolore et continue au contexte, décurrente, jusqu'à 8 mm de longueur
- Pied:** sans anneau, centré à latéral, simple à ramifié, tan à brun pourpré pâle, tomenteux à glabre
- Chair:** subéreux, azoné, blanchâtre, 0,3-1 cm d'épaisseur
- Odeur:** prononcée, agréable, de noisettes
- Saveur:** très amère, même au sec
- Habitat:** septembre-octobre, simple ou cespiteux sur une base commune ramifiée, sur sol de racines et souches de conifères, agent de carie brune cubique, rare
- Remarques:** pousse en groupes sur les souches de sapin
- Confusion:** peu de risque de confusion avec des champignons que l'on trouve en Suisse romande.
- Détermination:** Carpophore > Tubes ou pores sous le chapeau > Chaire dure ou pied non central (Polypores) > Sur bois > Chapeaux simples > Ne dépassant pas le support de plus de 15 cm > Pied central et grêle > Chapeau écailleux > Polyporus
- Classification:** Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Polyporales > Polyporaceae > Polyporus

Photos:



