

Polypore souris



Comestible, sans valeur

Recommandation officielle:



NON COMESTIBLE

Nom latin: *Postia tephroleuca*

Famille: A tubes > Fomitopsidaceae > *Postia*

Caractéristiques du genre *Postia*: chapeau: en forme de croute - lames: inexistant - pied: inexistant - remarques: responsable de la pourriture brune

Synonymes: *Oligoporus lacteus*, *Oligoporus tephroleucus*, *Spongiporus tephroleucus*, *Tyromyces elatinus*, *Spongiporus lacteus*, *Piptoporus elatinus*, *Tyromyces melinus*, *Tyromyces tephroleucus*, *Polyporus linearisporus*, *Hemidiscia lactea*, *Polyporus tokyoensis*, *Polyporus tokyvensis*, *Polystictus lacteus*, *Tyromyces lacteus*, *Polyporus cineratus*, *Bjerkandera cinerata*, *Polyporus melinus*, *Bjerkandera melina*, *Leptoporus lacteus*, *Leptoporus tephroleucus*, *Bjerkandera tephroleuca*, *Bjerkandera lactea*, *Postia lactea*, *Polyporus elatinus*, *Boletus tephroleucus*, *Polyporus lacteus*, *Polyporus tephroleucus*

Chapeau: 40-100mm, atteignant 40 mm d'épaisseur au point d'attachement, fructification tubériforme au début, puis en forme de console, largement fixée au substrat, surface piléique convexe ou aplatie, finement feutrée à lisse, un peu sinueuse, d'abord blanchâtre, puis gris-brunâtre, marge obtuse plus ou moins aiguë avec l'âge, gris-blanchâtre à corne, jaunissant un peu en séchant

Lamelles: sans lame, tubes blanchâtres, ne variant pas de teinte à la pression

Pied: sans anneau, sans pied, en console

Chair: blanche, immuable, dure

Odeur: neutre

Saveur: neutre, douce

Habitat: juillet-novembre, sur bois mort de feuillus, principalement hêtre et bouleau, assez fréquent localement

Remarques: parfois saveur amère

Confusion: Amadouvier des pins, Polypore marginé (*Fomitopsis pinicola*)
dans sa forme jeune, l'Amadouvier des pins est blanc, mais pousse sur les résineux

Classification: Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Polyporales > Dacrybolaceae > *Oligoporus*

Photos:

