

Plutée en parasol



Comestible

Recommandation officielle:  **NON COMESTIBLE**

Nom latin: *Pluteus petasatus*

Famille: *A lames > Pluteaceae > Pluteus*

Caractéristiques du genre *Pluteus* : chapeau: souvent aplani, cuticule celluleuse ou non - lames: adnées, trame régulière, pâles, puis rougeâtres - pied: épais, plein, sans anneau ni volve - remarques: saprophyte, voir également entolomes, p. 228

- Synonymes:** *Pluteus straminophilus*, *Pluteus viscidulus*, *Pluteus australis*, *Pluteus patricius*, *Pluteus magnus*, *Pluteus curtisii*, *Pluteus cervinus* var. *petasatus*, *Agaricus patricius*, *Agaricus patricius* var. *patricius*, *Agaricus curtisii*, *Agaricus petasatus*, *Pluteus cervinus* var. *patricius*
- Chapeau:** 3-20cm, hémisphérique ou campanulé au début, puis convexe à convexe-étalé, avec ou sans ombon large et bas, sec ou distinctement visqueux à l'humidité, souvent luisant, lisse, fibrilleux-squameux seulement autour du centre ou avec squamules distinctes brunes partout, avec ou sans fibrilles radiales, sur fond blanc pur, gris-brun pâle ou brun, plus rarement plus foncé, à marge unie ou translucide-striée
- Lamelles:** libres, ventruées, larges, très serrées, blanches au début, puis rose, à arêtes entières ou floconneuses et blanches
- Pied:** sans anneau, égal, légèrement élargi à la base, lisse ou avec fibrilles longitudinales brunes ou gris-brun, surtout près de la base, sur fond blanc
- Chair:** blanche
- Odeur:** très douce à désagréable, douce-raphanoïde, parfois prononcée à indistincte
- Saveur:** très douce à désagréable, douce-raphanoïde, parfois prononcée à indistincte
- Habitat:** juin-septembre, souvent grégaire ou cespiteux, plus rarement solitaire, saprotrophe, sur bois décomposé de feuillus, aussi sur copeaux de bois, sciure ou sur la couche d'humus, parcs, pelouses, le long des routes et autres milieux perturbés ou rudéralisés, mais aussi dans les forêts naturelles non perturbées
- Remarques:** Assez rare en Suisse romande
- Confusion:** Plutée couleur de cerf (*Pluteus cervinus*) dans sa forme claire
- Conservation:** Congélation - Séchage - Poudre
- Détermination:** Carpophore > Lamelles sous le chapeau > Lames minces véritables > Chair élastique ou molle, du moins dans le chapeau > Sporée non blanche > Sporée ni noire ni blanche > Sporée rose > Aspect de *Tricholoma*, *Mycena* ou *Omphalina* > Lamelles libres > Sans volve > *Pluteus*
- Classification:** Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae > Agaricales > Pluteaceae > *Pluteus*

Photos:



