

# Tricholome des crapauds



Comestible, sans valeur Recommandation officielle:



**NON COMESTIBLE**

Nom latin: *Tricholoma bufonium*

Famille: *A lames > Tricholomataceae > Tricholoma*

Caractéristiques du genre *Tricholoma* : chapeau: sec ou poisseux, nu à écailleux - lames: adnées, typiquement arrondies sur le pied, trame régulière - pied: épais, anneau absent ou rare, parfois avec cortine - remarques: mycorrhizien, plusieurs espèces toxiques

- Synonymes:** Gyrophila bufonia, Gyrophila sulphurea var. bufonia, Tricholoma sulphureum var. bufonium, Agaricus bufonius
- Chapeau:** 3-7cm, convexe à plan-convexe, sec, feutré, brun-pourpre foncé, marge parfois jaune, parfois brun pourpre au centre
- Lamelles:** espacées, échancrées, jaune vif
- Pied:** sans anneau, cylindrique, plus ou moins clavé, fibreux, jaunâtre, plein jeune mais fibreux et se creusant dans l'âge
- Chair:** jaune, épaisse
- Odeur:** gaz d'éclairage, typique
- Saveur:** désagréable
- Habitat:** août-novembre, en forêt, surtout sous feuillus, parfois sous conifères
- Remarques:** assez fréquent, son odeur est typique du genre
- Confusion:** Tricholome soufré (*Tricholoma sulphureum*)  
*couleur du chapeau jaune, concolore à la chair*
- Détermination:** Carpophore > Lamelles sous le chapeau > Lames minces véritables > Chair élastique ou molle, du moins dans le chapeau > Sporée blanche > Pas de volve > Pied central > Lamelles minces ou à consistance non cireuse > Lamelles non libres > Lamelles adnées ou échancrées > Chapeau plus de 4 cm > Pied ferme, cylindrique > Sur terre > Pied robuste ou sujets en touffes > Champignon non blanchâtre > Pied sans bulbe marginé > Tricholoma
- Classification:** Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae > Agaricales > Tricholomataceae > Gyrophila

## Photos:







**Photos micro:**

