Amanite citrine

Toxique **Recommandation officielle:** NON COMESTIBLE

Nom latin: Amanita citrina

Famille: A lames > Amanitaceae > Amanita

Caract?ristiques du genre Amanita : chapeau: avec ou sans reste de voile - lames: adnées, blanches, rarement jaunes, trame régulière - pied: épais, bulbeux, avec ou sans anneau, volve présente ou non - remarques: plusieurs espèces très toxiques

Synonymes: Amanitina citrina, Amanita mappa var. citrina, Amanita bulbosa var. citrina, Agaricus citrinoalbus, Amanita venenata, Amanita venenosa, Agaricus ovum

Chapeau: 4-10cm, globuleux à convexe puis étalé, nu ou orné de quelques flocons vélaires blanchâtres à jaunâtres, souvent lavande à gris violacé, sur fond jaune pâle à jaune verdâtre, vite blanchâtre, se tachant parfois de brunâtre `pourpré, à marge unie, puis devenant parfois très légèrement sillonnée à maturité, voile général membraneux à friable, blanc, jaunâtre à gris violacé, laissant souvent quelques flocons sur le chapeau

Lamelles: libres, avec nombreuses lamellules, serrées, blanchâtres, parfois jaune pâle

Pied: avec anneau, subégal, abruptement largement bulbeux-marginé et parfois fendu verticalement, glabre à finement fibrilleux, blanc à jaunâtre, annelé, émergeant d'une volve, volve membraneuse, en grande partie soudée à la base du pied, blanchâtre, voile partiel membraneux, blanc à jaunâtre, parfois gris violacé par endroits, laissant un anneau sur le pied, anneau membraneux, pendant, relativement persistant, blanc. jaune pâle ou grisâtre violacé

Chair: blanchâtre, immuable

Odeur: pomme de terre crue ou de rave

Saveur: rave

Habitat: août-octobre, solitaire, dispersé ou grégaire, mycorhizien, sur sol surtout des pinèdes, chênaies et conifère

Remarques: comesitble médiocre, considéré par certains comme étant toxique. Elle ne vaut pas les honneurs de la table, surtout aussi de par sa ressemblence avec la mortelle Amanite phalloïde

Confusion: Amanite citrine blanche (Amanita citrina var. alba)
couleur
Amanite phalloïde (Amanita phalloides)
couleur, volve

Toxicit?: Syndr?me: bufoténine - Poison: Bufoténine

Sympt?mes: Latence: de 1 à 4 heures, puis dilatation pupillaire, mouvements oscillatoires des yeux (nystagmus), nausées, troubles respiratoires et hypersudation. Simultanément, le sujet présente des hallucinations, essentiellement liées à des distorsions des perceptions visuelles.

Remarques: Ce syndrome provoque des effets mixtes, périphériques et centraux, de courte durée. Alcaloïde indolique isolé pour la première fois des glandes cutanées des crapauds.

Détermination: Carpophore > Lamelles sous le chapeau > Lames minces véritables > Chair élastique ou molle, du moins dans le chapeau > Sporée blanche > Avec volve parfois friable > Avec anneau > Amanita

Classification: Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae > Agaricales > Amanitaceae > Amanitina

El?ments identifiants:





Photos: