

# Ramaire flasque



Comestible, sans valeur Recommandation officielle:



**NON COMESTIBLE**

*Nom latin: Ramaria flaccida*

*Famille: Autres > Ramariaceae > Ramaria*

*Caractéristiques du genre Ramaria : chapeau: ramifié, généralement jaunâtre, ocre à rose saumon, chair cassante - lames: inexistants - pied: inexistant - remarques: saprophyte sur terre ou bois, certaines espèces sont toxiques, voir Clavulina*

- Synonymes:** Phaeoclavulina flaccida, Clavariella flaccida, Clavaria flaccida
- Chapeau:** 2-6cm, souvent arbusculaire, formé de rameaux et d'un pied, avec rameaux principaux dressés, mais non droits, 1-3 mm de diam., tendant à fendre le long du pied et s'appuyer sur le substrat à l'humidité, jaune-brun terne à crème brunâtre, axes étroitement arrondis, et 2 ou plusieurs pointes longues, aiguës, tan à ocre tan, immuables au froissement
- Lamelles:** sans lame, hyménophore souvent unilatéral, décurrent surtout sur les axes, avec zones fertiles brun neutre et zones stériles brun rouille au sec
- Pied:** sans anneau, souvent discret, souvent rudimentaire, avec les rameaux arrivant presque qu'au niveau du substrat, sillonné à cannelé, brun vers l'apex, pâle vers la base, immuable au froissement, avec petits rhizomorphes basaux filandreux, crème, teintés de brun au froissement et pâles au sec, parfois avec petit feutrage mycélien lâche
- Chair:** tenace, fibreuse, flasque, blanchâtre à jaunâtre
- Odeur:** indistincte à légèrement fruitée
- Saveur:** indistincte à amère
- Habitat:** août-octobre, souvent grégaire ou en arcs, sur sol parmi les aiguilles de conifères, pas rare localement
- Remarques:** version en plus petit des grandes Ramaires
- Confusion:** Clitocybe à bonne odeur (Paralepistopsis amoenolens)  
*odeur*  
Ramaire jaunâtre (Ramaria lutea)  
*couleur*
- Détermination:** Carpophore > Ni lamelles, ni tubes, ni pores, ni aiguillons sous le chapeau > Entièrement à l'air libre à maturité > Non étalé sur le bois sous forme de croûte > Ni l'aspect d'une croûte, ni la forme d'un dé à coudre > Pas l'aspect de petites masses hémisphériques > Forme d'origine pas sphérique > Chair non cassante comme de la cire ou champignon dressé avec tige en massue ou en branches ramifiées > Pas en forme de trompette, ni de cornet > Chair fragile ferme et cassante > Pied moyen à épais > Tronc ramifié > Rameaux à section circulaire > Plus de 5-6 cm, tronc très ramifié > Ramaria
- Classification:** Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Phallomycetidae > Gomphales > Gomphaceae > Phaeoclavulina

## Photos:

