

# Mycène à pied strié



Comestible, sans valeur Recommandation officielle:



**NON COMESTIBLE**

Nom latin: *Mycena polygramma*

Famille: *A lames > Tricholomataceae > Mycena*

Caractéristiques du genre *Mycena* : chapeau: hémisphérique, cône en cloche, rarement ombiliqué, généralement sec, hygrophane, humide strié par transparence, cuticule fine - lames: adnées, trame régulière, adhérentes à décurrentes, arête partiellement d'une couleur différente - pied: mince, généralement cassant, creux, parfois avec du lait - remarques: saprophyte terrestre ou sur débris de bois mort

**Synonymes:** *Agaricus polygrammus*

**Chapeau:** 2-4cm, conique-obtus à ovoïde puis conique à campanulé ou presque convexe avec petit ombon conique abrupt, parfois étalé et omboné-conique, viscidule avec l'âge, canescent blanc au début, avec pruine souvent persistante presque jusqu'à maturité, lisse, non hygrophane, noir bistré à bistré sous la pruine, lentement beige à grisâtre plus pâle, parfois presque chamois rosâtre, à marge légèrement incurvée au début, droite ou récurvée et ondulée avec l'âge, souvent crénelée, opaque, souvent sillonnée et plus ou moins inégale, apparaissant striée avec lignes luisantes

**Lamelles:** étroitement adnées à courtement uncinées, larges près du pied, 4-7 mm, 30-38 atteignant le pied, serrées, blanches à blanchâtres, lavées de rose avec l'âge, souvent tachées de brunâtre sordide, à arêtes entières, pâles

**Pied:** élancé, égal, parfois avec pseudorhize bien développée, profonde, parfois tordu-strié, cartilagineux, très cassant, tubuleux, légèrement poudreux et pâle à l'apex, fortement strié serré longitudinalement, à reflets argentés sur fond bistré à brun grisâtre plus pâle vers la base, taché de brun rougeâtre à la base, parfois subglabre et lisse ou glabre et sillonné longitudinalement, strigieux à la base

**Chair:** assez mince, très dure, cartilagineuse, blanche à grisâtre aqueux

**Odeur:** légère, de farine

**Saveur:** douce

**Habitat:** août-octobre, souvent dans la mousse, forêt mixte ou feuillus, au pied des souches ou à terre alentour, parfois même à la base de troncs encore vivants

**Remarques:** signe distinctif: stries, plus ou moins profondes sur toute la hauteur du stipe, pouvant être torsadées

**Confusion:** peu de risque de confusion avec des champignons que l'on trouve en Suisse romande.

**Détermination:** Carpophore > Lamelles sous le chapeau > Lames minces véritables > Chair élastique ou molle, du moins dans le chapeau > Sporée blanche > Pas de volve > Pied central > Lamelles minces ou à consistance non cireuse > Lamelles non libres > Lamelles adnées ou échancrées > Chapeau moins de 4 cm > Sans anneau > Pied grêle et fragile > Lamelles ni espacées ni rose vif ni violettes > *Mycena*

**Classification:** Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae > Agaricales > Mycenaceae > *Mycena*

## Photos:





