Cortinaire rouge brique, Cortinaire ocre-rouge

Comestible, sans valeur **Recommandation officielle:** NON COMESTIBLE

Nom latin: Cortinarius bolaris

Famille: A lames > Cortinariaceae > Cortinarius > Sericeocybe

Caract?ristiques du genre Sericeocybe : chapeau: massif, sec, tout au plus faiblement collant (jeune), parfois soyeux ou luisant, rarement écailleux, non hygrophane - lames: adnées, trame régulière, avec ous sans teine violette - pied: épais, sec, cylindrique à claviforme jamais avec bulbe marginé - remarques: mycorrhizien

Synonymes: Pholiota rigelliae, Inoloma bolare, Agaricus bolaris

Chapeau: 2-6cm, convexe puis étalé, souvent irrégulier, sec, fibrilleux au début, puis orné de squamules rouges à cinabre sur fond blanchâtre ou jaunâtre. Voile général rouge ou cinabre, laissant des restes vélaires sur le chapeau et le pied

Lamelles: adnées, peu larges, modérément serrées, crème brunâtre à ocre pâle, brun rouille avec l'âge

Pied: sans anneau, avec cortine, égal, largement clavé ou légèrement atténué vers la base, parfois comprimé, souvent creux, sec, orné de fibrilles ou de méchules rouges à cinabre sur fond blanc ou jaunâtre, devenant plus foncé avec l'âge, jaunissant au froissement. Cortine blanche

Chair: blanchâtre, jaune sous la cuticule et à la base du pied, jaunissant à la coupe

Odeur: indistincte, fongique

Saveur: indistincte, un peu poivrée, rappelant le radis

Habitat: août-septembre, grégaire par petits groupes, parfois cespiteux, mycorhizien, sur sol des forêts mixtes, chênes, sapins, hêtres, bouleaux

Remarques: jeune, presque blanc, peu à peu entièrement jaune chrome. Puis de plus en plus rouge cinabre avec l'âge et jaune brillant à la manipulation ou au froissement.

Confusion: peu de risque de confusion avec des champignons que l'on trouve en Suisse romande.

Détermination: Carpophore > Lamelles sous le chapeau > Lames minces véritables > Chair élastique ou molle, du moins dans le chapeau > Sporée non blanche > Sporée ni noire ni blanche > Sporée brun ou rouille > Pied central > Lamelles adhérentes au chapeau > Chapeau non sphérique, non ocre givré et non ridé à la base > Pas sur fumier > A terre, pas en touffes > Chapeau non capanulé ou lamelles non grises > Lamelles rouillé ferrugineux à maturité, cortine > Chapeau non visqueux > Chapeau sec, fibrilleux ou lisse > Revêtement lisse > Teintes gris-violet, ocre > Sericeocybe

Classification: Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae > Agaricales > Strophariaceae > Pholiota

Photos: