

Coprin des forêts



Comestible, sans valeur Recommandation officielle:



NON COMESTIBLE

Nom latin: Coprinellus silvaticus

Famille: A lames > Coprinaceae > Coprinus

Caractéristiques du genre Coprinus : chapeau: généralement déliquescent-noir à maturité, écailleux, velu ou luisant, sillonné radicalement - lames: adnées, trame régulière, grises puis déliquescent-noir à maturité, ascendantes, adhérentes, rarement libres - pied: épais à mince, généralement sans anneau - remarques: saprophyte sur bois ou sol fumé

Synonymes: Coprinellus tardus, Coprinus tardus, Coprinus silvaticus

Chapeau: 1.5-4cm, lorsque fermé, 4,5 cm de diam. après expansion, ovoïde puis campanulé à conique-convexe, rarement entièrement étalé, brun rougeâtre foncé au centre, ocre-brun à brun jaunâtre vers la marge, puis crème grisâtre, avec restes vélaires floconneux-granuleux, ocre brun, puis lisse, à marge profondément sillonnée jusqu'au centre, se fendant souvent

Lamelles: libres à adnexées, assez larges, très serrées, blanchâtres puis brun foncé à noirâtres, lentement déliquescentes ou non

Pied

Pied: sans anneau, assez fragile, lisse à pubescent, blanchâtre, se décolorant de chamois pâle, surtout vers la base

Chair: très mince, fragile, blanchâtre à grisonnante dans l'âge

Odeur: indistincte

Saveur: indistincte

Habitat: juin-novembre, débris ligneux enfouis des bois de feuillus aérés et leurs sentiers, bords des allées et clairières, en groupe

Remarques: se dégrade rapidement, comme la majorité des membres de cette famille

Confusion: peu de risque de confusion avec des champignons que l'on trouve en Suisse romande.

Détermination: Carpophore > Lamelles sous le chapeau > Lames minces véritables > Chair élastique ou molle, du moins dans le chapeau > Sporée non blanche > Sporée noire > Lamelles déliquescentes > Coprinus

Classification: Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae > Agaricales > Psathyrellaceae > Coprinellus

Photos:

