Lactaire caoutchouc, Lactaire presque doux

Comestible, sans valeur **Recommandation officielle:** NON COMESTIBLE

Nom latin: Lactarius subdulcis

Famille: A lames > Russulaceae > Lactarius

Caract?ristiques du genre Lactarius : chapeau: fragile, exudant un lait à la cassure, nu à velu, sec ou poisseux, cernes concentriques fréquents - lames: fragiles - pied: cylindrique, vite creux - remarques: mycorrhizien, on peut goûter de petits morceaux pour la détermination

Synonymes: Lactifluus subdulcis, Galorrheus subdulcis, Agaricus subdulcis

Chapeau: 3-7cm, mince, plan-convexe devenant plat et déprimé, parfois légèrement mamelonné, à surface irrégulière paraissant ridée, à marge mince, lisse à striée, de couleur beige chamois à roux terne parfois avec des reflets rosâtres, généralement non zoné

Lamelles: adnées à légèrement décurrentes, minces et serrées, doublées de lamelles et lamellules, de couleur crème passant à l'ocre, roussissant aux blessures

Pied: sans anneau, lisse, ferme, courbé à la base, à surface paraissant feutrée, de couleur d'abord blanchâtre puis devenant roussâtre tout en demeurant plus claire au sommet

Chair: blanchâtre, roussâtre en vieiliisant

Odeur: désagréable, punaise, caoutchouc, Scleroderme

Saveur: douce à légèrement amère, très rarement légèrement piquante

Habitat: septembre-novembre, principalement dans les bois de feuillus, appréciant la couverture des hêtres, en groupe de quelques carpophores

Remarques: l'un des Lactaires les plus tardifs. Assez rare

Confusion: Lactaire roux (Lactarius rufus)
Le lait brûlant fait la différence

Détermination: Carpophore > Lamelles sous le chapeau > Lames minces véritables > Chair cassante comme de la craie > Avec lait (latex) qui s'écoule à la cassure > Lactarius

Classification: Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Russulales > Russulaceae > Lactifluus

Photos:








Photos micro: