

Cortinaire de couleur variable, Cortinaire à odeur terreuse



Comestible, sans valeur Recommandation officielle:



NON COMESTIBLE

Nom latin: *Cortinarius variicolor*

Famille: *A lames > Cortinariaceae > Cortinarius > Phlegmacium*

Caractéristiques du genre *Phlegmacium* : chapeau: trapu, visqueux (rarement sec), non hygrophane - lames: adnées, trame régulière, jaunes, olive, violettes ou brun-roux - pied: épais, souvent bulbeux, sec, avec cortine double (au bord du bulbe et en haut) - remarques: mycorrhizien, les espèces jaune vif sont toxiques ou suspectes

Synonymes: *Cortinarius muricicolor, Cortinarius piriodolens, Gomphos variicolor, Phlegmacium variicolor, Pholiota variicolor, Cortinarius varicolor, Agaricus varicolor, Agaricus variicolor*

Chapeau: 6-14cm, longtemps convexe, glutineux, surtout au début, puis parfois sec, finement fibrilleux-vergeté, mélange de violacé et de brun roux pâle, violacé vers la marge, palissant par le sec, parfois un peu squamuleux au disque, viscidule mais vite sec

Lamelles: serrées, adnées à sinuées, violettes à argilé pâle au début, puis brun rouille, plus nettement violette vers la marge du chapeau

Pied: sans anneau, renflé à clavé vers la base, ochracé violeté pâle, robuste, ferme, sec, soyeux-fibrilleux, violet pâle puis brunissant dans le bas, cerné de lilas au sommet. Voile violet mais vite pâlisant, ne laissant que peu de traces. Cortine blanc lilacin, assez abondante au début mais fugace

Chair: compacte, lilas pâle puis blanchâtre sauf au sommet du pied plaques violacées ou plus brunâtre avec l'âge ou à l'humidité

Odeur: forte, terreuse, aromatique avec une composante désagréable dans les lames, s'accroissant avec l'âge

Saveur: douce

Habitat: juillet-novembre, sur sol des forêts de conifères en montagne, sur terrain silicieux

Remarques: sa forte odeur de terre le rend impropre à la consommation. La variété *nemorensis*, sosie du *variicolor*, pousse dans les bois de feuillus

Confusion: Cortinaire des bois (*Cortinarius nemorensis*)
Couleur de la chair
Cortinaire purpurin (*Cortinarius purpurascens*)
odeur, couleur

Détermination: Carpophage > Lamelles sous le chapeau > Lames minces véritables > Chair élastique ou molle, du moins dans le chapeau > Sporée non blanche > Sporée ni noire ni blanche > Sporée brun ou rouille > Pied central > Lamelles adhérentes au chapeau > Chapeau non sphérique, non ocre givré et non ridé à la base > Pas sur fumier > A terre, pas en touffes > Chapeau non capanulé ou lamelles non grises > Lamelles rouillé ferrugineux à maturité, cortine > Chapeau visqueux > Pied non visqueux > Pied bulbeux, sans marge, massif > *Phlegmacium*

Classification: Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae > Agaricales > Cortinariaceae > *Cortinarius*

Photos:













