

# Cladonia fimbriata



Comestible, sans valeur Recommandation officielle:



**NON COMESTIBLE**

*Nom latin: Cladonia fimbriata*

*Famille: Lichen*

*Caractéristiques du genre Lichen: chapeau: en forme de touffe, ou de croute - lames: inexistant - pied: inexistant - remarques: règne connexe aux champignons (ascomycètes)*

- Synonymes:** Scyphophora fimbriata, Lichen fimbriatus, Cenomyce pyxidata var. fimbriata
- Chapeau:** 1-4cm, gris verdâtre, en forme de fine trompette brusquement dilatées au sommet en une coupe aplatie de 5 mm de Ø, dentée sur la marge, non proliférante, portant parfois des petites apothécies ou des pycnides brunes sur le bord des scyphes. Thalle primaire formé de squamules généralement assez petites, pas toujours visibles, à petits lobes crénelés-divisés, gris-vert dessus, blanchâtres dessous
- Lamelles:** Néant
- Pied:** sans abnneau, dans la continuité du chapeau
- Chair:** coriace
- Odeur:** neutre
- Saveur:** neutre
- Habitat:** janvier-décembre, espèce courante, sur les sols acides parmi les mousses, occasionnellement dans la mousse sur les pierres, parfois sur bois en décomposition
- Remarques:** Souvent sur pierres dans la mousse
- Confusion:** peu de risque de confusion avec des champignons que l'on trouve en Suisse romande.
- Classification:** Fungi > Dikarya > Ascomycota > Pezizomycotina > Lecanoromycetes > Lecanoromycetidae > Lecanorales > Cladoniaceae > Cladonia

## Photos:

