

Polypore du frêne



Comestible, sans valeur

Recommandation officielle:



NON COMESTIBLE

Nom latin: *Perenniporia fraxinea*

Famille: A tubes > Polyporaceae > Polyporus

Caractéristiques du genre *Polyporus* : chapeau: coriace, élastique, sec, feutré à écailleux - lames: tubes en couches minces - pied: central ou excentrique - remarques: lignicole, saprophyte, plus rarement parasite, provoque une pourriture blanche

- Synonymes:** *Poria fraxinea*, *Haploporus fraxineus*, *Vanderbylia fraxinea*, *Polystictus leucomelas*, *Ungulina fraxinea*, *Fomes ganodermicus*, *Polystictoides leucomelas*, *Scindalma fraxineum*, *Ischnoderma fraxineum*, *Placodes fraxineus*, *Fomes fraxineus*, *Trametes fraxinea*, *Polyporus fraxineus*, *Boletus fraxineus*
- Chapeau:** 10-20cm, Fructification en forme de console, largement fixée au substrat, souvent de grande taille, large (jusqu'à 60 cm suivant les fructifications confluentes), 16-20 cm de projection et de 2-8-10 cm d'épaisseur. Surface un peu veloutée dans la jeunesse, ondulée, bosselée, lisse, mate, crème à ochracé clair, glabrescente avec de petites verrues ou crêtes minces, d'abord ochracées puis brun gris sale, souvent avec des taches rougeâtres. Marge + ou - aiguë, ondulée crénelée, crème à crème-orange au début, puis brun brunâtre
- Lamelles:** sans lames, face finement porée. Pores arrondis-anguleux, de 3 à 6 par mm suivant litt. surface liègeuse crème, se teintant de rose au sec, ou de brun lilas au toucher. Tubes stratifiés de 3 à 6 mm d'épaisseur, rose ochracé, jusqu'à 6 cm d'épaisseur dans les vieux spécimens suivant les couches séparées les unes des autres par une assise de trame
- Pied:** sans anneau, sans pied
- Chair:** Contexte coriace, fibreux, tubéreux, isabelle à crème ou jaune pâle, plus tard gris à brun pâle vers la surface du chapeau, faiblement zoné, jusqu'à 3 cm d'épaisseur à la base. Réaction brune au Melzer
- Odeur:** désagréable ou parfois d'anis
- Saveur:** légèrement amère
- Habitat:** août-octobre, souvent à la base des troncs, surtout de frênes, mais également sur d'autres feuillus vivants, souvent confluentes ou en groupes imbriqués. Pérenne. Tout au long de l'année. Assez rare. Pourriture blanche.
- Remarques:** D'abord couleur orangée, chamois dans la jeunesse, puis développement plus dur dans sa phase adulte
- Confusion:** peu de risque de confusion avec des champignons que l'on trouve en Suisse romande.
- Détermination:** Carpophore > Tubes ou pores sous le chapeau > Chaire dure ou pied non central (Polypores) > Sur bois > Chapeaux simples > Ne dépassant pas le support de plus de 15 cm > Pied central et grêle > Chapeau écailleux > Polyporus
- Classification:** Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Polyporales > Polyporaceae > Poria

Photos:

