

Plutée de Romell



Comestible, sans valeur

Recommandation officielle:  **NON COMESTIBLE**

Nom latin: *Pluteus romellii*

Famille: A lames > *Pluteaceae* > *Pluteus*

Caractéristiques du genre *Pluteus* : chapeau: souvent aplani, cuticule celluleuse ou non - lames: adnées, trame régulière, pâles, puis rougeâtres - pied: épais, plein, sans anneau ni volve - remarques: saprophyte, voir également *entolomes*, p. 228

- Synonymes:** *Pluteus splendidus*, *Pluteus nanus* subsp. *lutescens*, *Pluteus lutescens*, *Agaricus romellii*, *Pluteus nanus* var. *lutescens*, *Agaricus nanus* var. *lutescens*
- Chapeau:** 2-6cm, convexe puis plat mais assez souvent mamelonné, revêtement velouté, presque cireux, plus ou moins ridé, veiné, brun jaunâtre à brun fuligineux légèrement plus soutenu au disque, marge souvent plus pâle, striée par transparence
- Lamelles:** nettement libres, moyennement serrées, légèrement ventrues, blanches à jaunâtres puis rosées par les spores, arêtes entières et concolores
- Pied:** sans anneau, fragile, cylindrique, fibreux, jaune à jaune vif vers la base
- Chair:** hygrophane, molle, fragile, gris blanc jaunâtre, surtout dans le pied
- Odeur:** neutre
- Saveur:** douce
- Habitat:** août-octobre, saprophyte, sur toutes sortes de bois bien décomposés et débris ligneux (enfouis ou non) de feuillus, notamment le hêtre et l'érable
- Remarques:** se reconnaît à son pied jaune vers la base
- Confusion:** peu de risque de confusion avec des champignons que l'on trouve en Suisse romande.
- Détermination:** Carpophore > Lamelles sous le chapeau > Lames minces véritables > Chair élastique ou molle, du moins dans le chapeau > Sporée non blanche > Sporée ni noire ni blanche > Sporée rose > Aspect de *Tricholoma*, *Mycena* ou *Omphalina* > Lamelles libres > Sans volve > *Pluteus*
- Classification:** Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae > Agaricales > *Pluteaceae* > *Pluteus*

Photos micro:

