

# Cortinarius subturbinatus



Comestible, sans valeur

Recommandation officielle:



**NON COMESTIBLE**

Nom latin: *Cortinarius subturbinatus*

Famille: A lames > Cortinariaceae > Cortinarius > Phlegmacium

Caractéristiques du genre *Phlegmacium* : chapeau: trapu, visqueux (rarement sec), non hygrophane - lames: adnées, trame régulière, jaunes, olive, violettes ou brun-roux - pied: épais, souvent bulbeux, sec, avec cortine double (au bord du bulbe et en haut) - remarques: mycorrhizien, les espèces jaune vif sont toxiques ou suspectes

Synonymes: -

**Chapeau:** 6-10cm, jaune ocracé maculé de plaques blanches, d'abord entièrement jaune de chrome à jaune doré, vite orange-brunâtre à fauve-brunâtre à partir du centre, cuticule visqueuse, lisse et nue

**Lamelles:** jaune citron à jaune-olive, jaunâtre-roux-brunâtre à maturité

**Pied:** sans anneau, avec cortine marquée, d'abord blanche puis ocre, pied jaune citron à vert-jaunâtre avec bulbe marginé

**Chair:** massive, blanchâtre, jaune-verdâtre, vers la surface

**Odeur:** assez neutre, un peu d'aneth séché

**Saveur:** neutre

**Habitat:** septembre-novembre, bois de feuillus, surtout sous hêtre, sols calcaires, rare, montagne et plaine

**Remarques:** assez rare en Suisse romande

**Confusion:** Cortinaire odorifère (*Cortinarius odorifer*)  
odeur

**Détermination:** Carpophore > Lamelles sous le chapeau > Lames minces véritables > Chair élastique ou molle, du moins dans le chapeau > Sporée non blanche > Sporée ni noire ni blanche > Sporée brun ou rouille > Pied central > Lamelles adhérentes au chapeau > Chapeau non sphérique, non ocre givré et non ridé à la base > Pas sur fumier > A terre, pas en touffes > Chapeau non capitulé ou lamelles non grises > Lamelles rouillé ferrugineux à maturité, cortine > Chapeau visqueux > Pied non visqueux > Pied bulbeux, sans marge, massif > *Phlegmacium*

Classification: -

Photos loupe:



