

Pholiote changeante, Agaric à soupe



Comestible

Recommandation officielle:



COMESTIBLE

Nom latin: *Kuehneromyces mutabilis*




Famille: A lames > *Strophariaceae* > *Pholiota*







Caractéristiques du genre *Pholiota* : chapeau: nu à écailleux, sec ou visqueux, non hygrophane - lames: adnées, trame régulière, généralement avec chrysocystides - pied: épais à mince, avec ou sans anneau - remarques: parasite et saprophyte du bois, provoque une pourriture blanche





- Synonymes:** *Galerina mutabilis*, *Pholiota pseudomarginata*, *Pholiota decurrens*, *Dryophila mutabilis*, *Pholiota mutabilis*, *Agaricus mutabilis*
- Chapeau:** 2-8 cm, convexe, souvent un peu mamelonné, très hygrophane, luisant d'un beau jaune fauve, jaune-olive ou ocre-brun par temps sec, d'un brun cannelle par l'humidité, palissant à ocre livide à partir du centre. Surface lisse ou finement floconneuse sauf à la marge qui présente des mèches poilues pâles ou brunâtres, fugaces, la marginelle étant toujours un peu translucide
- Lamelles:** rose-brunâtre à roux-brunâtre, adnées
- Pied:** jaunâtre, brunissant vers la base, avec anneau membraneux, écailleux-floconneux au-dessous. Tenace, cylindrique, plein puis creux, le pied noirci à la base. Un petit anneau apical étroit, membraneux-pelucheux, concolore au pied mais brunissant, bientôt affaissé et plus ou moins fugace.
- Chair:** peu épaisse, brun clair, assez serrées à serrées, adnées ou décurrentes par une dent
- Odeur:** fine, suave, mirabelle
- Saveur:** douce
- Habitat:** mai-novembre, en groupe (touffe) sur souches pourrissantes de feuillus, surtout de hêtres, plus rare sur conifère, commune, saprophyte
- Remarques:** comestible de bonne qualité en garniture. N'employer que les chapeaux, les pieds étant coriaces.
- Confusion:** Galère marginée (*Galerina marginata*)
ainsi que certains hypholomes.
La Galère marginée ne pousse pas autant en touffes que la Pholiote changeante.
Pour les non-initiés, ce sont des sosies, il faut donc être extrêmement prudent.
Tubaire furfuracé (*Tubaria furfuracea*)
plaques et flocons: Tubaria, lisse: Pholiote
- Conservation:** Congélation - Conserve de saumure - Poudre
- Détermination:** Carpophore > Lamelles sous le chapeau > Lames minces véritables > Chair élastique ou molle, du moins dans le chapeau > Sporée non blanche > Sporée ni noire ni blanche > Sporée brun ou rouille > Pied central > Lamelles adhérentes au chapeau > Chapeau non sphérique, non ocre givré et non ridé à la base > Pas sur fumier > En touffes sur bois mort ou au pied des souches > Odeur et saveur farineuses ou chapeau non hygrophane > Odeur et saveur non farineuses > Chapeau fortement écailleux ou crème verdâtre et visqueux > *Pholiota*
- Classification:** Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae > Agaricales > *Strophariaceae* > *Galerina*

Photos:













Photos loupe:



Photos micro:

