

Volvaire gluante



Comestible

Recommandation officielle:



NON COMESTIBLE

Nom latin: Volvariella gloiocephala

Famille: A lames > Agaricaceae > Volvariella

Caractéristiques du genre Volvariella : chapeau: collant ou sec, généralement nu - lames: adnées, incolores puis rougeâtres, trame régulière, libres - pied: épais, plein, sans anneau, volve membraneuse à la base - remarques: saprophyte, rarement parasite

Synonymes: Volvopluteus gloiocephalus, Volvariella gloiocephala var. speciosa, Volvariella gloiocephala var. gloiocephala, Volvariella speciosa f. gloiocephala, Volvariella speciosa, Volvariella speciosa var. gloiocephala, Volvaria speciosa var. gloiocephala, Volvaria speciosa f. gloiocephala, Volvariopsis speciosa, Volvariopsis emendatior, Volvariopsis gloiocephala, Volvaria gloiocephala, Volvaria speciosa, Agaricus emendatior, Pluteus speciosus, Agaricus speciosus, Agaricus gloiocephalus, Agaricus gloiocephalus, Amanita speciosa

Chapeau: 5-15cm, ovoïde à globuleux au début, puis campanulé, convexe à étalé, plus ou moins ombré, viscidule à visqueux à l'humidité, luisant au sec, lisse ou parfois avec plaques vélaires (surtout chez les jeunes), blanchâtre, grisâtre à brun grisâtre, rarement fauve, souvent plus foncé au centre et avec reflets métalliques, à marge unie à légèrement striée

Lamelles: libres, larges, ventrues, serrées à très serrées, blanches au début, puis rose foncé à rougeâtre sordide, à arêtes entières ou érodées

Pied: sans anneau, égal à élargi vers la base, parfois bulbeux jusqu'à 3 cm de largeur, plein, lisse ou vilieux à tomenteux vers la base, glabrescent, sec, blanchâtre, crème à grisâtre pâle, facile à séparer du pied. Volve à la base du pied, membraneuse, sacciforme, peu profonde, assez superficielle ou souvent enfouie, uni, lacéré ou lobé à la marge, blanche à gris pâle à la base

Chair: modérément épaisse au centre, amincie vers la marge, molle, blanche, brunissante dans le pied, non hygrophane, molle, fibreuse surtout dans le pied que l'on plie sans le casser

Odeur: désagréable, de rève

Saveur: désagréable, de rève

Habitat: août-novembre, sols riches en humus, cultivés et fumés, riches en nitrates, en milieux ouverts, pelouses, jardins, champs, serres, débris ligneux, copeaux de bois, bran de scie, composts, parfois en forêts, solitaire, dispersé ou grégaire, parfois en troupes assez nombreuses. Assez rare en Suisse romande

Remarques: a tendance à accumuler les pollutions dues aux nitrates, il vaut donc mieux l'éviter, d'autant que le champignon lui-même ne présente pas de grandes qualités gustatives

Confusion: Amanite phalloïde (Amanita phalloides)
dans sa variété blanche
Amanite printanière (Amanita verna)
Amanite vireuse (Amanita virosa)

Conservation: Séchage - Poudre

Détermination: Carpophore > Lamelles sous le chapeau > Lames minces véritables > Chair élastique ou molle, du moins dans le chapeau > Sporée non blanche > Sporée ni noire ni blanche > Sporée rose > Aspect de Tricholoma, Mycena ou Omphalina > Lamelles libres > Avec volve > Volvariella

Classification: Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae > Agaricales > Pluteaceae > Volvopluteus

Photos:



