

Paxille enroulé



Toxique

Recommandation officielle:  **TOXIQUE**

Nom latin: *Paxillus involutus*

Famille: *A lames > Paxillaceae > Paxillus*

Caractéristiques du genre *Paxillus* : chapeau: sec à collant, marge enroulée - lames: adnées, trame bilatérale, serrées, décurrentes, réunies - pied: épais, central à excentrique, nu à velout - remarques: saprophyte ou mycorrhizien

- Synonymes:** *Rhymovis involuta*, *Omphalia involuta*, *Agaricus involutus*, *Agaricus contiguus*
- Chapeau:** 5-15cm, mamelonné, convexe puis étalé et déprimé, marge très enroulée, épaisse, rayée de cannelures, feutrée, cuticule séparable, jaunâtre, brune, présentant quelques reflets rougeâtres, feutrée, douce, à peine visqueuse à l'humide
- Lamelles:** décurrentes, très fines et serrées, fourchues, facilement détachables, de couleur jaunâtre devenant rouille
- Pied:** sans anneau, pied court, souvent courbé, parfois légèrement excentré, de même couleur générale ou un peu plus clair que le chapeau, parfois taché de zones ocre à rouille, devenant brun ochracé vers la base qui est plus étroite
- Chair:** épaisse, ferme, vite molle, jaunâtre brun-rouge à la coupe
- Odeur:** acidulée, fruitée, métallique
- Saveur:** douce à légèrement salée
- Habitat:** juillet-novembre, appréciant l'humidité des bois de feuillus comme de résineux, sur sol acide ou tourbeux, talus, bords des chemins et des fossés, clairières, parfois même sur les pelouses
- Remarques:** Longtemps considéré comme comestible, il s'est avéré que, mal cuit ou suite à consommations répétées sur 2 à 3 repas, des accidents graves sont survenus, pour certains fatals, et aux vues des qualités gustatives de ce champignon, il est préférable de s'en abstenir totalement
- Confusion:** Paxille à pied noir, Paxille à pied de velours (*Tapinella atrotomentosa*)
également quelques lactaires
- Toxicité:** Syndrôme: paxillien - Poison: Hémolysine (entre autres)
accumulation de la toxine sur consommations répétées. Accidents graves, pour certains fatals
Symptômes: Latence: 1 à 3 heures, puis troubles digestifs, nausées, vomissements, douleurs gastriques et intestinales, diarrhées sanguinolentes, collapsus cardiovasculaires, chez certaines personnes c'est une réaction allergique extrêmement grave, caractérisée par une hémolyse (destruction des globules rouges) et/ou une atteinte rénale, ou encore des cytolyses hépatiques avec parfois une évolution vers le coma.
Remarques: Le mécanisme de cette intoxication rare reste mal compris. Dans tous les cas d'intoxication, une hospitalisation s'impose avec un traitement symptomatique, souvent une hémodialyse et des transfusions peuvent même être nécessaires.
- Détermination:** Carpophore > Lamelles sous le chapeau > Lames minces véritables > Chair élastique ou molle, du moins dans le chapeau > Sporée non blanche > Sporée ni noire ni blanche > Sporée brun ou rouille > Pied central > Pied non radicaire > Lamelles facilement séparables, décurrentes > Chapeau plus de 5 cm > *Paxillus*
- Classification:** Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae > Boletales > Paxillaceae > *Rhymovis*

















Photos:







Photos micro:



Paxille à pied noir, Paxille à pied de velours



Toxique

Recommandation officielle:



NON COMESTIBLE

Nom latin: Tapinella atrotomentosa


Famille: A lames > Paxillaceae > Paxillus

Caractéristiques du genre Paxillus : chapeau: sec à collant, marge enroulée - lames: adnées, trame bilatérale, serrées, décurrentes, réunies - pied: épais, central à excentrique, nu à velout - remarques: saprophyte ou mycorrhizien

- Synonymes:** Sarcopaxillus atrotomentosus, Rhymovis atrotomentosa, Paxillus atrotomentosus, Agaricus atrotomentosus
- Chapeau:** 5-20cm, difforme, bosselé, épais, convexe se creusant ensuite en entonnoir, à marge longtemps fortement enroulée et peu cannelée, cuticule facilement séparable sur la totalité du chapeau, épaisse, jaunâtre brun-roux café au lait, feutrée, douce au toucher
- Lamelles:** décurrentes, serrées et ramifiées, soudées entre elles à la base, de couleur crème à jaunâtre se tachant de rouille à brun violacé/rougeâtre au toucher, brunissant en vieillissant, adnées, fourchues, molles, fragiles, très faciles à séparer
- Pied:** sans anneau, trapu et robuste, court et épais, plus ou moins excentré, duveteux, plein, élastique, feutré jusqu'aux lames d'un velours brun foncé noir
- Chair:** blanchâtre, plutôt épaisse, molle, spongieuse, gorgée d'eau, très amère, jamais attaquée par les larves
- Odeur:** désagréable, métallique, rappelant celle du scléroderme, légèrement fétide
- Saveur:** amarescente à très amère, parfois indistincte
- Habitat:** août-novembre, surtout sur les vieilles souches, également sur troncs et branches mortes pourries de feuillus mais surtout de conifères
- Remarques:** amer, peut provoquer des intoxications
- Confusion:** Paxille enroulé (Paxillus involutus)
et certains lactaires si l'on ne considère pas la couleur du pied, ni le fait qu'ils exsudent du lait
- Toxicité:** Syndrôme: gastro-intestinal (= résinoïdien) - Poison: Chitine, tréhalose, mannitol, etc.
amer, peut provoquer des intoxications
Symptômes: Latence: 3-6 heures, puis nausées, des vomissements, des douleurs gastriques et des diarrhées.
Remarques: Ce syndrome provoque essentiellement des nausées, des vomissements, des douleurs gastriques et des diarrhées. Ce syndrome peut être provoqué par une multitude d'espèces de champignons et par diverses causes. Les champignons comestibles mangés en trop grandes quantité peuvent provoquer ce syndrome car les champignons contiennent des molécules peu digestes (chitine) et/ou uniques aux champignons (tréhalose, mannitol). Les personnes ayant un déficit en tréhalase (enzyme qui dégrade le tréhalose) peuvent avoir des diarrhées. Certaines espèces, dans certains cas, peuvent être toxiques: Armillaria sp., Lepista sp., Agaricus xanthoderma (Agaric jaunissant)
Syndrôme: paxillien - Poison: Hémolysine (entre autres)
Symptômes: Latence: 1 à 3 heures, puis troubles digestifs, nausées, vomissements, douleurs gastriques et intestinales, diarrhées sanguinolentes, collapsus cardiovasculaires, chez certaines personnes c'est une réaction allergique extrêmement grave, caractérisée par une hémolyse (destruction des globules rouges) et/ou une atteinte rénale, ou encore des cytolyses hépatiques avec parfois une évolution vers le coma.
Remarques: Le mécanisme de cette intoxication rare reste mal compris. Dans tous les cas d'intoxication, une hospitalisation s'impose avec un traitement symptomatique, souvent une hémodialyse et des transfusions peuvent même être nécessaires.
- Détermination:** Carpophore > Lamelles sous le chapeau > Lames minces véritables > Chair élastique ou molle, du moins dans le chapeau > Sporée non blanche > Sporée ni noire ni blanche > Sporée brun ou rouille > Pied central > Pied non radicaire > Lamelles facilement séparables, décurrentes > Chapeau plus de 5 cm > Paxillus
- Classification:** Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae > Boletales > Paxillaceae > Sarcopaxillus

Photos:





Photos micro:

