

Panéole papilionacé



Toxique

Recommandation officielle:



NON COMESTIBLE


Nom latin: *Panaeolus papilionaceus*



Famille: *A lames > Coprinaceae > Panaeolus*

Caractéristiques du genre *Panaeolus*: chapeau: parabolique, conique en cloche, hémisphérique, généralement hygrophane, cuticule sèche, rarement collante, avec ou sans voile, cuticule celluleuse - lames: adnées, trame régulière, noirâtres à maturité, tachetées (typique) - pied: mince, généralement sans anneau - remarques: saprophyte






- Synonymes:** *Panaeolus campanulatus* var. *sphinctrinus*, *Coprinarius campanulatus* var. *sphinctrinus*, *Panaeolus papilionaceus* var. *papilionaceus*, *Panaeolus sphinctrinus*, *Coprinarius papilionaceus*, *Agaricus sphinctrinus*, *Coprinus papilionaceus*, *Agaricus papilionaceus*
- Chapeau:** 2-4cm, ovoïde puis campanulé, campanulé-convexe à presque hémisphérique, étalé ou non à la fin, souvent légèrement papillé, lisse ou craquelé, parfois ruguleux ou plissé, mat à soyeux-brillant, blanchâtre, chamois, gris pâle à jaune-gris-brun ou gris olivacé plus ou moins foncé ou brun rougeâtre, parfois teinté de rose avec l'âge et plus foncé vers le centre, à marge aiguë, appendiculée-crênelée de restes vélaires blanchâtres au début
- Lamelles:** adnées à adnexées, vite sécédentes, larges, avec lamellules, subespacées à serrées, grisâtres puis marbrées, noires à la fin, à arêtes floconneuses, blanchâtres
- Pied:** sans anneau, égal à légèrement élargi à la base, droit, fibreux, cassant, fistuleux, souvent strié, entièrement pruneux blanc sur fond crème grisâtre à brun rougeâtre, plus pâle à l'apex, devenant brun depuis la base, avec feutrage basal blanc
- Chair:** plus épaisse au disque, amincie vers la marge, cassante, crème, à la surface veloutée
- Odeur:** légèrement fongique
- Saveur:** douce, fongique
- Habitat:** mai-octobre, sur excréments ou fumiers (parfois couverts), champs, pâturages, milieux riches herbeux en azote et forêts
- Remarques:** parfois considéré comme le frère jumeau de la panéole coprophile, la différence étant faite par le milieu dans lequel pousse le carpophore
- Confusion:** Panéole coprophile (*Panaeolus semiovatus*)
La couleur du chapeau est un peu plus claire
Psilocybe lancéolé (Psilocybe semilanceata)
couleur du chapeau
- Toxicité:** Syndrome: narcotinique (= psilocybin) - Poison: Psilocybine
hallucinogène, contient de la psilocybine et de la psilocine
Symptômes: Latence: environ 30 minutes, puis atteinte du système nerveux central avec des hallucinations. Les effets sont variables selon le contexte. Les effets sont une euphorie et des sensations visuelles, auditives et tactiles et différents autres troubles. Ces effets peuvent être accompagnés d'angoisse, de panique et de confusion et provoquer des nausées, des vomissements, des vertiges, etc. Des effets psychiatriques graves peuvent aussi se déclarer.
Remarques: Ce syndrome provoque une intoxication de type hallucinogène. Les espèces qui produisent ce syndrome sont: *Psilocybe semilanceata* et d'autres champignons des genres *Psilocybe*, *Panaeolus*, *Pholiotina* et *Stropharia*. La législation interdit la récolte, la détention et le transport de ces champignons. La substance toxique est la psilocybine (substance voisine du LSD). Cette molécule se fixe sur les récepteurs de la sérotonine et donc inhibe certaines parties du cerveau.
- Détermination:** Carpophore > Lamelles sous le chapeau > Lames minces véritables > Chair élastique ou molle, du moins dans le chapeau > Sporée non blanche > Sporée noire > Lamelles non déliquescentes > Lamelles non roses sur les jeunes > Lamelles non décurrentes > Cortine légère > Chapeau hygrophane et fragile > Chapeau en cloche, lamelles tachetées > *Panaeolus*
- Classification:** Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae > Agaricales > Psathyrellaceae > *Panaeolus* > *Panaeolus campanulatus*

Photos:





Photos micro:



Panéole coprophile



Toxique

Recommandation officielle:



NON COMESTIBLE

Nom latin: *Panaeolus semiovatus*

Famille: A lames > *Coprinaceae* > *Panaeolus*

Caractéristiques du genre *Panaeolus*: chapeau: parabolique, conique en cloche, hémisphérique, généralement hygrophane, cuticule sèche, rarement collante, avec ou sans voile, cuticule celluleuse - lames: adnées, trame régulière, noirâtres à maturité, tachetées (typique) - pied: mince, généralement sans anneau - remarques: saprophyte

- Synonymes:** *Anellaria semiovata*, *Stropharia separata*, *Coprinarius separatus*, *Anellaria separata*, *Panaeolus separatus*, *Pholiota separata*, *Amanita separata*, *Coprinus semiovatus*, *Agaricus semiovatus*, *Agaricus separatus*, *Panaeolus semiovatus* var. *semiovatus*
- Chapeau:** 2-6cm, d'abord ovoïde puis rapidement campanulé à conique, à marge unie parfois très légèrement striée ou cannelée, lisse et brillant, de couleur blanchâtre à grisâtre à gris ochracé
- Lamelles:** épaisses et fines, à lamellules intercalées, de couleur grisâtre à gris à arêtes soulignées de blanc
- Pied:** anneau très petit, d'abord blanchâtre puis noircissant, disparaissant ou s'estompant souvent avec l'âge. Pied long et fin (jusqu'à 15 cm), cylindrique, légèrement pruineux au sommet et devenant lisse vers la base
- Chair:** molle, blanchâtre
- Odeur:** faiblement herbacée à fongique
- Saveur:** indistincte
- Habitat:** juin-novembre, prairies, pâturages et chemins empruntés par le bétail, émergeant souvent des excréments en décomposition
- Remarques:** relativement courant, il se développe généralement en petits groupes de quelques individus. On le trouve partout où il existe des passages d'animaux, surtout de chevaux, aussi bien dans les zones herbues que sur les chemins et allées cavalières des forêts. Présence de psilocybine douteuse.
Parfois considéré comme le frère jumeau de la panéole papillonacé, la différence étant faite par le milieu dans lequel pousse le carpophore
- Confusion:** *Inocybe à lames terreuses (Inocybe geophylla)*
couleur du chapeau
Panéole papillonacé (*Panaeolus papilionaceus*)
La couleur du chapeau est un peu plus sombre
Psilocybe lancéolé (Psilocybe semilanceata)
couleur du chapeau
- Toxicité:** Syndrome: narcotinique (= psilocybin) - Poison: Psilocybine
Présence de psilocybine douteuse
Symptômes: Latence: environ 30 minutes, puis atteinte du système nerveux central avec des hallucinations. Les effets sont variables selon le contexte. Les effets sont une euphorie et des sensations visuelles, auditives et tactiles et différents autres troubles. Ces effets peuvent être accompagnés d'angoisse, de panique et de confusion et provoquer des nausées, des vomissements, des vertiges, etc. Des effets psychiatriques graves peuvent aussi se déclarer.
Remarques: Ce syndrome provoque une intoxication de type hallucinogène. Les espèces qui produisent ce syndrome sont: *Psilocybe semilanceata* et d'autres champignons des genres *Psilocybe*, *Panaeolus*, *Pholiota* et *Stropharia*. La législation interdit la récolte, la détention et le transport de ces champignons. La substance toxique est la psilocybine (substance voisine du LSD). Cette molécule se fixe sur les récepteurs de la sérotonine et donc inhibe certaines parties du cerveau.
- Détermination:** Carpophore > Lamelles sous le chapeau > Lames minces véritables > Chair élastique ou molle, du moins dans le chapeau > Sporée non blanche > Sporée noire > Lamelles non déliquescentes > Lamelles non roses sur les jeunes > Lamelles non décurrentes > Cortine légère > Chapeau hygrophane et fragile > Chapeau en cloche, lamelles tachetées > *Panaeolus*
- Classification:** Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae > Agaricales > Strophariaceae > *Anellaria*

Photos:

