

Schizophylle commun



Comestible, sans valeur



NON COMESTIBLE

Nom latin: *Schizophyllum commune*

Famille: A lames > Schizophyllaceae > Schizophyllum

Caractéristiques du genre *Schizophyllum*: chapeau: discoïde, cupuliforme ou flabelliforme, assez tenace, sec, pubescent à poilu, feutré, rugueux, dans les tons de blanchâtre, grisâtre à brunâtre, à marge enroulée ou sillonnée au sec, étalée à l'humidité, à marge souvent profondément incisée - lames: vite fendue pour formée des plaques lamelliformes, formées de plis, de côtes ou de pseudolames arrivant du bord latéral fusionné au basidiome, légèrement ondulés, brun pâle, à arêtes libres - pied: absent ou rudimentaire - remarques: vite fendue pour formée des plaques lamelliformes, formées de plis, de côtes ou de pseudolames arrivant du bord latéral fusionné au basidiome, légèrement ondulés, brun pâle, à arêtes libres, odeur et saveur indistinctes

- Synonymes:** Merulius communis, Schizophyllum alneum, Schizophyllum alneus, Daedalea commune, Apus alneus, Scaphophoeum agaricoides, Merulius alneus, Agaricus alneus
- Chapeau:** 1-5cm, flabelliforme à vasiforme, conchoïde, irrégulier, effusé-réfléchi ou stipité latéralement, sec, densément poilu, feutré-tomenteux, hirsute à farineux, blanc, blanc grisâtre à gris, parfois gris brunâtre à gris-brun à l'humidité, à marge ondulée, lobée à incisée, souvent enroulée au sec
- Lamelles:** radiantes du point d'attache, cassantes, cireuses, espacées, blanches, grisâtres à tan pâle, à arêtes apparaissant fissiles ou sillonnées longitudinalement, cupulées en section transverse, s'enroulant sur elles-mêmes au sec, protégeant l'hyménium
- Pied:** sans anneau, absent ou présent comme point d'attache latéral basal, souvent arrondi à la coupe
- Chair:** mince, tenace, coriace, pâle ou grisâtre
- Odeur:** agréable, douce ou aigrelette
- Saveur:** douce ou aigre
- Habitat:** janvier-décembre, sur bois mort ou parfois vivant de feuillus, tiges, souches, billes, dispersé, grégaire ou souvent en amas imbriqués, commune
- Remarques:** trop petit et coriace pour être consommé
- Confusion:** peu de risque de confusion avec des champignons que l'on trouve en Suisse romande.
- Détermination:** Carpophore > Lamelles sous le chapeau > Lames minces véritables > Chair élastique ou molle, du moins dans le chapeau > Sporée blanche > Pas de volve > Pied latéral ou excentrique > Chapeau lisse et pied latéral > Chapeau sans couche gélatineuse > Chapeau feutré, lamelles roses > Schizophyllum
- Classification:** Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Polyporales > Meruliaceae > Merulius

Photos:

