

Bolet orangé



Bon comestible

Recommandation officielle:



COMESTIBLE

Nom latin: *Leccinum aurantiacum*

Famille: A tubes > Boletaceae > Leccinum

Caractéristiques du genre *Leccinum* : chapeau: sec, mat à velouté, tout au plus un peu collant avec l'âge - lames: tubes facilement séparables, ventrus sur les vieux exemplaires - pied: généralement assez mince, réticulé - remarques: mycorrhizien

- Synonymes:** *Leccinum populinum*, *Leccinum leucopodium*, *Boletus salicola*, *Krombholziella salicola*, *Leccinum salicicola*, *Leccinum salicola*, *Boletus versipellis* var. *aurantiacus*, *Trachypus aurantiacus*, *Krombholziella aurantiaca*, *Krombholzia aurantiaca*, *Boletus scaber* var. *aurantiacus*, *Leccinum aurantiacum* var. *leucopodium*, *Boletus aurantius* var. *leucopodius*, *Boletus leucopodius*, *Boletus aurantiacus*
- Chapeau:** 8-15cm, charnu, d'abord hémisphérique puis convexe, à surface irrégulière, à marge très peu enroulée devenant lisse à faiblement excédente et parfois légèrement ondulée, à cuticule finement feutrée, de couleur vive allant de l'orangé ou roux orangé ou parfois plus foncé
- Lamelles:** néant: tubes longs, d'abord de couleur blanchâtre puis devenant grisâtre à brunâtre
- Pied:** sans anneau, d'abord généralement trapu voire obèse mais pouvant être également cylindrique, puis s'allongeant et devenant légèrement renflé à la base, rugueux, blanchâtre à blanc grisâtre parsemé de squamules de couleur blanche devenant ensuite brun-rougeâtre puis noirâtre, bleu verdâtre à la base
- Chair:** blanche, devenant rosée-violacée puis noirâtre à la coupe, surtout à la jonction du pied et du chapeau, molle dans le chapeau, verdissant avec l'âge
- Odeur:** agréable, fongique
- Saveur:** douce
- Habitat:** juillet-octobre, bois de trembles, plus rarement sous d'autres feuillus, le plus souvent sur les sols argileux et dans les dépressions plus humides, les coupe-feux en creux et les abords des fossés, le plus souvent caché dans les zones herbeuses lorsqu'il fait sec
- Remarques:** plusieurs sous-espèces en fonction de leur habitat
- Confusion:** Bolet roux, Bolet roussissant (*Leccinum versipelle*)
Leccinum versipelle a un pied avec des verrues noires réparties uniformément alors que *Leccinum rufum* a des verrues oranges disposées en stries verticales
Bolet rude (*Leccinum scabrum*)
Cèpe des pins (*Boletus pinophilus*)
- Conservation:** Congélation: les vieux exemplaires ont tendance à devenir très mous, devient gluant si cuit - Séchage - Poudre
- Détermination:** Carpophore > Tubes ou pores sous le chapeau > Chair tendre et pied central (Bolets) > Chapeau non écaillé > Pores non roses > Chapeau non visqueux > Pied long et couvert de petites écailles > *Leccinum*
- Classification:** Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae > Boletales > Boletaceae > *Leccinum*

Photos:





Bolet blanc-de-neige



Comestible

Recommandation officielle:



COMESTIBLE

Nom latin: *Leccinum holopus*

Famille: A tubes > Boletaceae > Leccinum

Caractéristiques du genre *Leccinum* : chapeau: sec, mat à velouté, tout au plus un peu collant avec l'âge - lames: tubes facilement séparables, ventrus sur les vieux exemplaires - pied: généralement assez mince, réticulé - remarques: mycorrhizien

- Synonymes:** *Leccinum holopus* var. *nucatum*, *Leccinum nucatum*, *Krombholziella holopus*, *Trachypus holopus*, *Krombholzia holopoda*, *Krombholzia holopus*, *Trachypus scaber* f. *holopus*, *Boletus holopus*
- Chapeau:** 4-10cm, convexe-aigu à convexe puis largement convexe à subétalé, souvent visqueux avec l'âge ou à l'humidité, glabre ou presque, blanchâtre ou brunâtre, devenant souvent verdâtre avec l'âge
- Lamelles:** tubes, blanchâtre, brunissant à maturité, parfois ornée de minuscules taches bleu-vert, brunissant au froissement, tubes concolores à la face poroïde, 1-2.5 cm de longueur
- Pied:** sans anneau, égal à légèrement élargi vers la base, plein, sec, blanchâtre, orné de fines rugosités devenant brun-noir avec l'âge
- Chair:** blanche, rougissant lentement à la coupe, surtout à l'apex du pied, parfois aussi grisonnante
- Odeur:** indistincte
- Saveur:** indistincte
- Habitat:** juillet-octobre, sur sol sous bouleaux, en milieux humides, souvent parmi la mousse, fréquent aux abords des lacs en régions montagneuses
- Remarques:** caractérisé par sa stature très élancée et sa coloration blanchâtre
- Confusion:** peu de risque de confusion avec des champignons que l'on trouve en Suisse romande.
- Conservation:** Congélation - Conserve de saumure - Séchage - Poudre
- Détermination:** Carpophore > Tubes ou pores sous le chapeau > Chair tendre et pied central (Bolets) > Chapeau non écailleux > Pores non roses > Chapeau non visqueux > Pied long et couvert de petites écailles > *Leccinum*
- Classification:** Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae > Boletales > Boletaceae > *Leccinum* > *Leccinum holopus*

Photos:



Bolet rude



Comestible

Recommandation officielle:



COMESTIBLE

Nom latin: *Leccinum scabrum*

Famille: A tubes > Boletaceae > Leccinum

Caractéristiques du genre *Leccinum* : chapeau: sec, mat à velouté, tout au plus un peu collant avec l'âge - lames: tubes facilement séparables, ventrus sur les vieux exemplaires - pied: généralement assez mince, réticulé - remarques: mycorrhizien

- Synonymes:** *Leccinum scabrum* var. *roseofractum*, *Leccinum scabrum* var. *avellaneum*, *Boletus roseofractus*, *Leccinum rigidipes*, *Krombholziella avellanea*, *Krombholziella roseofracta*, *Leccinum avellaneum*, *Boletus avellaneus*, *Leccinum subcinnamomeum*, *Leccinum roseofractum*, *Trachypus scaber*, *Krombholziella scabra*, *Cerionomyces scaber*, *Gyroporus scaber*, *Krombholzia scabra*, *Boletus scaber*
- Chapeau:** 4-15cm, d'abord hémisphérique, globuleux et épais, puis vite étalé, non cabossé. Marge épaisse, non débordante et laissant vite apparaître les tubes, régulière, lisse, entière, concolore. Cuticule séparable sur vieux sujets, adnée quand jeunes. Sa surface est humide, au début, finement pruinée sans être franchement veloutée, grasse à l'humidité, parfois fendillée au sec, aux couleurs assez variables : du brun clair jaunâtre au brun-fauve, brun-rougeâtre ou brun-noir. Elle se gerce et se fissure très tôt, et dispose de vagues dépressions très caractéristiques ressemblant à des empreintes de doigt sur le pourtour
- Lamelles:** néant. Les tubes sont fins, longs, blanchâtres puis grisonnants en vieillissant, à extrémités jaunâtres
- Pied:** long et élancé, presque fibreux, plutôt tenace, en général épaissi de haut en bas, orné de granulations d'abord grises puis marron foncé assez en relief sur un fond rugueux et pâle, simili-structurées
- Chair:** ferme au début et devient assez tôt molle, blanche au début parfois jaunie sous les tubes mais elle vire au rosé après la coupe et noircit même chez espèces assez voisines
- Odeur:** faible ou légèrement acidulée
- Saveur:** douce
- Habitat:** juillet-octobre, dans les bois clairs, pinèdes humides, en mélange avec des bouleaux mais aussi d'autres feuillus, se développant souvent aussi parmi les feuilles de lierre rampant lorsqu'il fait sec
- Remarques:** généralement trop mou, insipide et souvent gluant.
- Confusion:** Cèpe des pins (*Boletus pinophilus*)
également Bolet des peupliers, rare en Suisse romande
- Conservation:** Séchage: les vieux exemplaires ont tendance à devenir très mous - Poudre
- Détermination:** Carpophore > Tubes ou pores sous le chapeau > Chair tendre et pied central (Bolets) > Chapeau non écailleux > Pores non roses > Chapeau non visqueux > Pied long et couvert de petites écailles > *Leccinum*
- Classification:** Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae > Boletales > Boletaceae > *Leccinum* > *Leccinum scabrum*

Photos:





Bolet roux, Bolet roussissant



Bon comestible

Recommandation officielle:



COMESTIBLE

Nom latin: *Leccinum versipelle*

Famille: A tubes > Boletaceae > Leccinum

Caractéristiques du genre *Leccinum* : chapeau: sec, mat à velouté, tout au plus un peu collant avec l'âge - lames: tubes facilement séparables, ventrus sur les vieux exemplaires - pied: généralement assez mince, réticulé - remarques: mycorrhizien

- Synonymes:** *Leccinum callitrichum*, *Leccinum cerinum*, *Leccinum percandidum*, *Leccinum rufescens*, *Krombholziella versipellis*, *Krombholziella roseotincta*, *Krombholziella rufescens*, *Boletus percandidus*, *Leccinum roseotinctum*, *Krombholzia aurantiaca* f. *rufescens*, *Krombholzia rufescens* f. *percandida*, *Leccinum testaceoscabrum*, *Trachypus rufescens*, *Krombholzia rufescens*, *Boletus rufescens*, *Boletus versipellis*
- Chapeau:** 7-15cm, hémisphérique devenant convexe étalé, à marge excédente et parfois légèrement ondulée, à cuticule veloutée par temps sec et visqueuse à l'humidité, de couleur terne allant du jaune orangé à orange ou roux, parfois brun orangé
- Lamelles:** tubes fins, de couleur blanche devenant ensuite blanchâtre à crème puis ocre jaunâtre, et parfois plus foncés encore, en vieillissant
- Pied:** sans anneau, généralement moins massif que les autres bolets mais ferme et souvent plus épais à la base, couvert de petites mèches granuleuses grisâtres devenant noires, vert bleuâtre à la base
- Chair:** blanche virant au noirâtre en passant par le rosâtre puis rouge violacé, base du stipe souvent bleue verdâtre
- Odeur:** neutre
- Saveur:** douce
- Habitat:** septembre-novembre, plutôt montagnard associé par mycorhizes aux bouleaux (*Betula*) parmi les bruyères, en terrain léger et à tendance acide
- Remarques:** Très proche du bolet orangé, il ne s'en différencie pratiquement que par la couleur des mèches ornant le pied et un chapeau généralement plus clair
- Confusion:** Bolet orangé (*Leccinum aurantiacum*)
Leccinum versipelle a un pied avec des verrues noires réparties uniformément alors que *Leccinum rufum* a des verrues oranges disposées en stries verticales
- Conservation:** Séchage - Poudre
- Détermination:** Carpophore > Tubes ou pores sous le chapeau > Chair tendre et pied central (Bolets) > Chapeau non écailleux > Pores non roses > Chapeau non visqueux > Pied long et couvert de petites écailles > *Leccinum*
- Classification:** Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae > Boletales > Boletaceae > *Leccinum*

Photos:



