

Bolet à pied creux



Comestible

Recommandation officielle:



COMESTIBLE

Nom latin: *Boletinus cavipes*

Famille: *A tubes > Boletaceae > Suillus*

Caractéristiques du genre *Suillus* : chapeau: généralement collant, brillant (sec), rarement feutré et sec - lames: tubes facilement séparables - pied: avec anneau ou zone annulaire collante - remarques: mycorrhizien

Synonymes: Boletus cavipes

Chapeau: 3-12cm, arrondi à convexe puis subétalé, parfois avec ombon arrondi, sec, fibrilleux-méchuleux, brun rougeâtre à brun orangé, rarement jaune doré, à marge souvent appendiculée de restes vélaire secs et blanchâtres

Lamelles: néant, pores jaune pâle puis olivacée, brunissant avec l'âge, immuable au froissement, anguleux et parfois radiant du pied, assez larges

Pied: avec anneau délicat, blanchâtre, pied subégal à légèrement élargi vers la base, creux à maturité, fragile, jaune pâle à l'apex, concolore au chapeau ou plus pâle sous la zone annuliforme

Chair: blanchâtre ou jaunâtre, immuable à la coupe

Odeur: indistincte

Saveur: neutre

Habitat: septembre-novembre, sous mélèzes ou pins sylvestres, en montagne, dispersé ou grégaire, le long des sentiers de forêt, localement fréquent

Remarques: parfois considérée de qualité médiocre par certains, d'autres la trouvent plutôt bonne, il en existe des formes à chapeau jaune d'or, orangé ou rouille

Confusion: Tricholome roux, Tricholome couleur de vache, Tricholome écaillé (Tricholoma vaccinum) *si l'on ne considère que la cuticule, de plus ils ont le même habitat, il n'est pas rare de trouver l'un à côté de l'autre*


Conservation: Séchage - Poudre

Détermination: Carpophore > Tubes ou pores sous le chapeau > Chair tendre et pied central (Bolets) > Chapeau non écaillé > Pores non roses > Chapeau visqueux ou finement moucheté > Chair douce > Suillus

Classification: Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae > Boletales > Boletaceae > Boletus

Photos:





Bolet des bouviers



Comestible

Recommandation officielle:



COMESTIBLE

Nom latin: Suillus bovinus

Famille: A tubes > Boletaceae > Suillus

Caractéristiques du genre Suillus : chapeau: généralement collant, brillant (sec), rarement feutré et sec - lames: tubes facilement séparables - pied: avec anneau ou zone annulaire collante - remarques: mycorrhizien

- Synonymes:** Mariaella bovina, Ixocomus bovinus, Agaricus bovinus, Boletus bovinus
- Chapeau:** 4-12cm, jaune-brun, fauve brunâtre, présentant souvent une bosse au centre, cuticule séparable entièrement mais tenace, fine, visqueuse, brillante, unie
- Lamelles:** tubes à l'ouverture anguleuse et dentelée importante, décourants sur le pied, séparables, non bleuissant, adnés à très légèrement décourants, de couleur jaune verdâtre brunissant au toucher
- Pied:** sans anneau, plein, ferme, de couleur identique au chapeau, légèrement marbré, lisse, souvent courbe
- Chair:** ferme, puis molle, élastique, épaisse au centre, souvent véreuse, blanchâtre légèrement jaune, à peine bleuissante dans le chapeau à la coupe
- Odeur:** neutre, faiblement fruitée ou rappelant le scléroderme coupé
- Saveur:** douce
- Habitat:** septembre-novembre, essentiellement dans les bois de résineux, souvent dans les zones herbues des pinèdes et des landes, appréciant les zones aérées et les sols acides
- Remarques:** en groupes de plusieurs individus, parfois nombreux. Il devient visqueux à l'humidité. Sa chair molle et sa saveur assez quelconque ou doucâtre le classent parmi les comestibles sans grande valeur. Souvent en présence de Gomphidius roseus
- Confusion:** Bolet granulé (Suillus granulatus)
Tubes irréguliers pour Suillus bovinus alors qu'ils sont réguliers et plus petits chez Suillus granulatus.
Pied sans granulation pour Suillus bovinus alors qu'il est granuleux chez Suillus granulatus
- Conservation:** Séchage - Poudre
- Détermination:** Carpophore > Tubes ou pores sous le chapeau > Chair tendre et pied central (Bolets) > Chapeau non écailleux > Pores non roses > Chapeau visqueux ou finement moucheté > Chair douce > Suillus
- Classification:** Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae > Boletales > Suillaceae > Mariaella

Photos:





Bolet à base rose, Bolet enduit



Comestible

Recommandation officielle:



NON COMESTIBLE

Nom latin: *Suillus collinitus*

Famille: *A tubes > Boletaceae > Suillus*

Caractéristiques du genre *Suillus* : chapeau: généralement collant, brillant (sec), rarement feutré et sec - lames: tubes facilement séparables - pied: avec anneau ou zone annulaire collante - remarques: mycorrhizien

Synonymes: *Boletus collinitus*

Chapeau: 4-12cm, irrégulier, globuleux à hémisphérique puis convexe à plan-convexe, cuticule visqueuse, collante, brillante, facile à séparer, brune de teinte variable décorée de minuscules stries radiales, marge concolore, incurvée, un peu excédante

Lamelles: tubes adnés à décurrents, séparables, courts, jaune pâle puis se salissant dans l'âge, pores fins, réguliers, anguleux, jaune crème pâle puis jaunâtres à jaune vif, exsudant des gouttes laiteuses chez les jeunes spécimens

Pied: sans anneau, cylindrique et trapu, jaune vif en haut et crème ailleurs, et orné de granulations brunâtres, base du stipe distinctement rose

Chair: blanchâtre à jaune pâle, plus soutenu dans le pied, non grisonnante ni bleuissante, ferme jeune vite amollie

Odeur: acidulée

Saveur: légèrement épicée

Habitat: juillet-octobre, mycorhise avec les pins, terrain calcaire

Remarques: la cuticule peut être laxative, il faut la retirer. Sa qualité gustative est diversement appréciée. surnommé Pissacan par les méridionaux


Confusion: Bolet granulé (*Suillus granulatus*)
granulé: chapeau brun homogène sans fibrilles, mycélium blanc. Base rose: chapeau brun fibrilleux, mycélium rose

Conservation: Séchage - Poudre

Détermination: Carpophore > Tubes ou pores sous le chapeau > Chair tendre et pied central (Bolets) > Chapeau non écailleux > Pores non roses > Chapeau visqueux ou finement moucheté > Chair douce > *Suillus*

Classification: Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae > Boletales > Suillaceae > *Suillus*

Photos micro:



Bolet granulé



Bon comestible

Recommandation officielle:



COMESTIBLE

Nom latin: Suillus granulatus

Famille: A tubes > Boletaceae > Suillus

Caractéristiques du genre Suillus : chapeau: généralement collant, brillant (sec), rarement feutré et sec - lames: tubes facilement séparables - pied: avec anneau ou zone annulaire collante - remarques: mycorrhizien

- Synonymes:** Ixocomus granulatus, Rostkovites granulatus, Suillus granulatus var. granulatus, Boletus granulatus
- Chapeau:** 6-13cm, hémisphérique devenant convexe puis s'aplatissant, visqueux, à marge lisse devenant sinueuse en vieillissant, cuticule visqueuse, collante, brillante, facile à séparer, beige jaunâtre à orangé jaunâtre, orangé ocre ou encore brun, marge concolore, incurvée, un peu excédante
- Lamelles:** pas de lames, tubes adnés à légèrement décurrents, séparables, jaune pâle puis se salissant dans l'âge - pores fins, réguliers, anguleux, jaune crème pâle puis jaunâtres à jaune vif, exsudant des gouttes laiteuses chez les jeunes spécimens
- Pied:** sans anneau, cylindrique et élancé mais parfois un peu renflé, d'abord assez ferme puis ramollissant, de couleur jaune très pâle au sommet, qui est légèrement granuleux, à jaune devenant brun ochracé vers la base, ponctué de granulations blanchâtres laiteuses puis jaunissantes et brunissantes
- Chair:** blanchâtre à jaune pâle, plus soutenu dans le pied, non grisonnante ni bleuissante, ferme jeune vite molle
- Odeur:** agréable, épicée, aromatique
- Saveur:** douceâtre à légèrement acidulée
- Habitat:** juin-octobre, essentiellement dans les bois clairs de résineux, aussi bien dans l'herbe que dans la litière des pins, le plus souvent en groupes de plusieurs individus, parfois assez nombreux
- Remarques:** bon comestible quoique chair un peu molle, retirez la cuticule qui, pour certains, peut se montrer laxative. A l'état juvénile, le bolet granulé exsude des gouttes d'aspect laiteux par les pores ainsi que par le sommet du pied
- Confusion:** Bolet à base rose, Bolet enduit (Suillus collinitus)
granulé: chapeau brun homogène sans fibrilles, mycélium blanc. Base rose: chapeau brun fibrilleux, mycélium rose
Bolet des bouviers (Suillus bovinus)
Tubes irréguliers pour Suillus bovinus alors qu'ils sont réguliers et plus petits chez Suillus granulatus.
Pied sans granulation pour Suillus bovinus alors qu'il est granuleux chez Suillus granulatus
Bolet jaune, Nonnette voilée (Suillus luteus)
Exsudant du lait à l'état jeune
- Conservation:** Séchage - Poudre
- Détermination:** Carpophore > Tubes ou pores sous le chapeau > Chair tendre et pied central (Bolets) > Chapeau non écailleux > Pores non roses > Chapeau visqueux ou finement moucheté > Chair douce > Suillus
- Classification:** Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae > Boletales > Suillaceae > Ixocomus

Photos:





Bolet élégant



Comestible

Recommandation officielle:



COMESTIBLE

Nom latin: *Suillus grevillei*


Famille: *A tubes > Boletaceae > Suillus*

Caractéristiques du genre *Suillus* : chapeau: généralement collant, brillant (sec), rarement feutré et sec - lames: tubes facilement séparables - pied: avec anneau ou zone annulaire collante - remarques: mycorrhizien




- Synonymes:** *Boletinus grevillei*, *Ixocomus grevillei*, *Suillus flavus*, *Suillus elegans*, *Boletopsis elegans*, *Boletopsis flava*, *Ixocomus flavus*, *Ixocomus flavus* var. *elegans*, *Boletus elegans* var. *flavus*, *Boletus grevillei*, *Pinuzza flava*, *Boletus flavus*, *Boletus flavus* var. *elegans*
- Chapeau:** 2-7cm, hémisphérique devenant convexe, à marge lisse et excédente à l'état adulte, de couleur jaune citron à jaune vif et souvent roux orangé selon l'exposition, légèrement plus claire vers la marge
- Lamelles:** néant : tubes adnés à légèrement décurrents, fins, de couleur jaune devenant gris rose à gris roux au toucher
- Pied:** d'abord jaune citrin puis devenant doré et marqué de fibrilles de couleur brun ochracé sous l'anneau, légèrement plus clair au dessus, de couleur blanche à blanchâtre à la base, base du pied bleuit à la coupe
- Chair:** jaune, veinules violacées à la coupe, molle, spongieuse, gorgée d'eau
- Odeur:** faiblement fruitée ou fleurie
- Saveur:** douce
- Habitat:** août-novembre, bois et parcs comportant surtout des résineux, affectionnant particulièrement la couverture des mélèzes et une humidité relativement importante, principalement en montagne
- Remarques:** peler le chapeau avant de le consommer, il y a des meilleurs bolets que celui-ci
- Confusion:** Bolet jaune var. blanche (*Suillus luteus* var. *album*)
Bolet jaune, Nonnette voilée (*Suillus luteus*)
- Conservation:** Séchage - Poudre
- Détermination:** Carpophore > Tubes ou pores sous le chapeau > Chair tendre et pied central (Bolets) > Chapeau non écailleux > Pores non roses > Chapeau visqueux ou finement moucheté > Chair douce > *Suillus*
- Classification:** Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae > Boletales > Suillaceae > *Boletinus*

Photos:





Photos micro:



Bolet jaune, Nonnette voilée



Comestible

Recommandation officielle:



COMESTIBLE

Nom latin: Suillus luteus

Famille: A tubes > Boletaceae > Suillus

Caractéristiques du genre Suillus : chapeau: généralement collant, brillant (sec), rarement feutré et sec - lames: tubes facilement séparables - pied: avec anneau ou zone annulaire collante - remarques: mycorrhizien

- Synonymes:** Boletopsis lutea, Ixocomus luteus, Viscipellis luteus, Cricunopus luteus, Boletus volvatus, Boletus luteus
- Chapeau:** 5-12cm, hémisphérique puis convexe, à marge lisse, de couleur brune à brun ochracé, parfois nettement plus clair et jusqu'à jaune, à l'aspect brillant et visqueux
- Lamelles:** néant, tubes d'abord jaunes devenant ensuite verdâtres, longtemps cachés par une cortine blanche
- Pied:** anneau membraneux formé par les restes du voile recouvrant l'hymenophore à l'état juvénile, de couleur blanche à blanchâtre devenant lilas à violet, pied court et massif, blanchâtre à jaunâtre, plutôt granuleux vers le sommet
- Chair:** blanchâtre à jaunâtre, spongieuse
- Odeur:** fruitée
- Saveur:** douce
- Habitat:** août-octobre, herbe des chemins, talus et bords des fossés, dans les bois de conifères uniquement, en montagne, souvent en groupe, assez commun
- Remarques:** en fonction de son âge et de l'humidité ambiante, il peut passer du brun à l'orange puis au jaune vif.
Peler le chapeau car la peau est gluante et amère, à manger jeune, devient amer avec l'âge
- Confusion:** Bolet élégant (Suillus grevillei)
Bolet granulé (Suillus granulatus)
sans lait
Bolet jaune var. blanche (Suillus luteus var. album)
- Conservation:** Séchage - Poudre
- Détermination:** Carpophore > Tubes ou pores sous le chapeau > Chair tendre et pied central (Bolets) > Chapeau non écailleux > Pores non roses > Chapeau visqueux ou finement moucheté > Chair douce > Suillus
- Classification:** Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Thelephorales > Bankeraceae > Boletopsis

Photos:



Bolet jaune var. blanche



Comestible

Recommandation officielle:



COMESTIBLE

Nom latin: Suillus luteus var. album

Famille: A tubes > Boletaceae > Suillus

Caractéristiques du genre Suillus : chapeau: généralement collant, brillant (sec), rarement feutré et sec - lames: tubes facilement séparables - pied: avec anneau ou zone annulaire collante - remarques: mycorrhizien

Synonymes: -

Chapeau: 5-12cm, hémisphérique puis convexe, à marge lisse, de couleur brune à brun ochracé, parfois nettement plus clair et jusqu'à jaune, à l'aspect brillant et visqueux

Lamelles: néant, tubes d'abord jaunes devenant ensuite verdâtres, longtemps cachés par une cortine blanche

Pied: anneau membraneux formé par les restes du voile recouvrant l'hymenophore à l'état juvénile, de couleur blanche à blanchâtre devenant lilas à violet, pied court et massif, blanchâtre à jaunâtre, plutôt granuleux vers le sommet

Chair: blanchâtre à jaunâtre, spongieuse

Odeur: fruitée

Saveur: douce

Habitat: août-octobre, herbe des chemins, talus et bords des fossés, dans les bois de conifères uniquement, en montagne, souvent en groupe, assez commun

Remarques: en fonction de son âge et de l'humidité ambiante, il peut passer du brun à l'orange puis au jaune vif.
Peler le chapeau car la peau est gluante et amère, à manger jeune, devient amer avec l'âge



Confusion: Bolet élégant (*Suillus grevillei*)
Bolet jaune, Nonnette voilée (*Suillus luteus*)

Conservation: Séchage - Poudre

Détermination: Carpophore > Tubes ou pores sous le chapeau > Chair tendre et pied central (Bolets) > Chapeau non écailleux > Pores non roses > Chapeau visqueux ou finement moucheté > Chair douce > *Suillus*

Classification: -

Photos:



Bolet visqueux



Comestible

Recommandation officielle:



COMESTIBLE

Nom latin: Suillus viscidus

Famille: A tubes > Boletaceae > Suillus

Caractéristiques du genre Suillus : chapeau: généralement collant, brillant (sec), rarement feutré et sec - lames: tubes facilement séparables - pied: avec anneau ou zone annulaire collante - remarques: mycorrhizien

- Synonymes:** Suillus serotinus, Suillus collarius, Fuscoboletinus viscidus, Fuscoboletinus serotinus, Boletopsis sordida, Boletopsis larigna, Boletopsis serotina, Boletopsis viscida, Boletus larignus, Boletus luteobadius, Ixocomus viscidus, Boletus serotinus, Boletus elbensis, Boletus viscidus, Boletus collarius
- Chapeau:** 3-12cm, obtus puis largement convexe à subétalé, glabre, parfois aréolé au sec, visqueux à glutineux au frais, avec gluten hyalin sur fond de couleur variable, grisâtre, gris verdâtre, brun grisâtre pâle, jaune-brun à brun
- Lamelles:** néant, tubes subégaux à élargis vers la base, plein, parfois largement réticulé près de l'apex, fibrilleux à furfuracé, blanchâtre à brun pâle au-dessus de l'anneau, grisâtre pâle, brun grisâtre à brun au-dessous
- Pied:** sans anneau, subégal à élargi vers la base, plein, parfois largement réticulé près de l'apex, fibrilleux à furfuracé, blanchâtre à brun pâle au-dessus de l'anneau, grisâtre pâle, brun grisâtre à brun au-dessous
- Chair:** blanche à jaune pâle, devenant vert bleuâtre à la coupe, parfois lentement et faiblement, flasque
- Odeur:** faible
- Saveur:** neutre
- Habitat:** juillet-novembre, sur sol sous mélèzes, en montagne, dispersé ou grégaire, occasionnel
- Remarques:** sa chair flasque en fait un médiocre comestible
- Confusion:** Bolet élégant (Suillus grevillei)
Bolet jaune var. blanche (Suillus luteus var. album)
Bolet jaune, Nonnette voilée (Suillus luteus)
- Conservation:** Séchage - Poudre
- Détermination:** Carpophore > Tubes ou pores sous le chapeau > Chair tendre et pied central (Bolets) > Chapeau non écailleux > Pores non roses > Chapeau visqueux ou finement moucheté > Chair douce > Suillus
- Classification:** Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae > Boletales > Suillaceae > Suillus

Photos:



