Exidie noirâtre

Comestible, sans valeur **Recommandation officielle:** NON COMESTIBLE

Nom latin: Exidia nigricans

Famille: Autres > Tremellaceae > Exidia

Caractéristiques du genre Exidia : chapeau: masse irrégulière, variable, gélatineuse, se rétrécissant et devenant cornée et séchant, couche fertile avec verrues d'aspect glanduleux - lames: inexistants - pied: inexistant - remarques: saprophyte sur le bois, provoque une pourriture blanche

Synonymes:	Exidia plana
Chapeau:	1-1.5cm, pulviné, glanduleux, vésiculeux à lobé-ondulé et presque incolore au début, puis souvent étalé, cérébriforme, fusionnant en masse irrégulière extensive plissée ou lobée, souvent jusqu'à 50 cm de longueur, sessile, gélatinisé, à face externe lisse à légèrement rugueuse, translucide, luisante au frais ou mate,
Lamelles:	sans lames
Pied:	sans anneau, sans pied
Chair:	gélatineuse, molle, parfois transparente, se rétrécit sèche et racornit au sec
Odeur:	nulle
Saveur:	nulle
Habitat:	janvier-décembre, grégaire ou en rangée et souvent confluent, saprotrophe, sur bois vivant ou mort de feuillus, branches au sol et découpes des troncs, plus rarement blessures d'arbres vivants
Remarques:	composé de nombreux petits carpophores s'imbriquant pour former une couche épaisse de 5 à 15 mm., longue jusqu'à 10 - 20 cm ou plus jusqu'à pouvoir recouvrir toute la longueur d'une branche. Aussi appelé Beurre de sorcière
Confusion:	peu de risque de confusion avec des champignons que l'on trouve en Suisse romande.
Détermination:	Carpophore > Ni lamelles, ni tubes, ni pores, ni aiguillons sous le chapeau > Entièrement à l'air libre à maturité > Champignon étalé, en forme de croûte > Chair molle, irrégulière, presque gluante > Chair non jaune > Exidia
Classification:	Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Auriculariomycetidae > Auriculariales > Exidiaceae > Exidia

Photos:

Exidie portière

Comestible, sans valeur **Recommandation officielle:** NON COMESTIBLE

Nom latin: Exidia thuretiana

Famille: Autres > Tremellaceae > Exidia

Caractéristiques du genre Exidia : chapeau: masse irrégulière, variable, gélatineuse, se rétrécissant et devenant cornée et séchant, couche fertile avec verrues d'aspect glanduleux - lames: inexistants - pied: inexistant - remarques: saprophyte sur le bois, provoque une pourriture blanche

Synonymes: Heterochaete europaea, Tremella thuretiana

Chapeau: 2-10cm, formant une masse gélatineuse ressemblant à une cervelle de couleur blanche, translucide, hérissé de mèches papilliformes, gélatineux ferme, puis discoïde et étalé, ou allongé, étroitement appliqué au substrat à l'état frais,souvent appliqué dans l'axe de la branche, en forme de bouton dans la jeunesse, bords libres, ciliés et villeux en dessous, blanc opalin . Hyménium lisse, puineux, à la fin subliquescent, uniforme, fauvâtre sur le sec. Surface bosselée, ondulée, blanche à bleuâtre opaline, avec parfois une petite teinte ocre ou rose, parfois zonées de couleurs ochracées

Lamelles: néant : surface lisse mais cabossée, de couleur blanche et translucide

Pied: sans anneau, sans pied

Chair: Gélatineuse, coriace

Odeur: indistincte

Saveur: indistincte

Habitat: décembre-mai, branches tombées ou tenant à l'arbre, cortiquées ou non, à la face inf. ou sup. de divers feuillus

Remarques: Egalement synonymisé avec Exidia albida par certains auteurs

Confusion: peu de risque de confusion avec des champignons que l'on trouve en Suisse romande.

Détermination: Carpophore > Ni lamelles, ni tubes, ni pores, ni aiguillons sous le chapeau > Entièrement à l'air libre à maturité > Champignon étalé, en forme de croûte > Chair molle, irrégulière, presque gluante > Chair non jaune > Exidia

Classification: Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Auriculariomycetidae > Auriculariales > Exidiaceae > Heterochaete

Photos:

Photos micro:
























Cheveux d'anges

Comestible, sans valeur **Recommandation officielle:** NON COMESTIBLE

Nom latin: Exidiopsis effusa

Famille: Autres > Tremellaceae > Exidia

Caractéristiques du genre Exidia : chapeau: masse irrégulière, variable, gélatineuse, se rétrécissant et devenant cornée et séchant, couche fertile avec verrues d'aspect glanduleux - lames: inexistants - pied: inexistant - remarques: saprophyte sur le bois, provoque une pourriture blanche

Synonymes: Exidiopsis grisea var. effusa, Myxarium nucleatum var. laccatum, Myxarium laccatum, Exidiopsis laccata, Sebacina uvida subsp. peritricha, Sebacina laccata, Exidiopsis peritricha, Sebacina peritricha, Sebacina effusa, Sebacina quercina, Thelephora effusa

Chapeau: 0.3mm, en forme de croûte, céracée à l'état frais, formant comme un enduit savonneux, très finement pelliculaire à l'état sec, se présente sous forme de petites taches irrégulières qui finissent par confluer, marge irrégulière mais nettement limitée

Lamelles: sans lames, surface hyméniale lisse et mate, séparable en fine membranule fragile, pruineuse, rose-clair, fleur de pêcher, argenté-bleuâtre, gris blanchâtre, décoloré pâle au séchage

Pied: sans anneau, sans pied

Chair: peu ou à peine gélatineuse

Odeur: neutre

Saveur: neutre

Habitat: janvier-décembre, en foret, sur branches mortes de feuillus, principalement hêtre, pas rare, toute l'année, surtout en périodes humides, plus abondant dans les régions montagneuse, non lignivore.

Remarques: Responsable des cheveux d'anges lorsque les conditions météo sont favorables, temps humide et gelées légères

Confusion: peu de risque de confusion avec des champignons que l'on trouve en Suisse romande.

Détermination: Carpophore > Ni lamelles, ni tubes, ni pores, ni aiguillons sous le chapeau > Entièrement à l'air libre à maturité > Champignon étalé, en forme de croûte > Chair molle, irrégulière, presque gluante > Chair non jaune > Exidia

Classification: Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Auriculariomycetidae > Auriculariales > Exidiaceae > Myxarium > Myxarium nucleatum