

Fuligo blanche, crachat de coucou



Comestible, sans valeur

Recommandation officielle:



NON COMESTIBLE

Nom latin: *Fuligo candida*

Famille: Autres > Physaracae > *Fuligo*

Caractéristiques du genre *Fuligo*: chapeau: en forme de mousse - lames: inexistant, spores noires - pied: inexistant - remarques: entre le règne des champignons et des protozoaires

Synonymes: -

Chapeau: 5cm, masse blanche, plasmode ressemblant à une mousse au chocolat blanc, pulviné, largement étalé, incrusté de calcaire granuleux, fragile, cassant, s'émiettant facilement, formant une masse irrégulière, blanc à blanchâtre, parfois crème à grisâtre

Lamelles: sans lames

Pied: sans anneau, sans pied

Chair: formé de filaments abondants, réticulés, délicats, légèrement élastiques, hyalins, reliés par des noeuds calcaires assez petits, parfois dispersés à presque absents, parfois seulement sous plusieurs granules calcaires agglutinés à l'intérieur des tubes capillitiaux, blancs

Odeur: neutre

Saveur: neutre

Habitat: juin-novembre, commun par région, solitaire, saprotrophe, sur bois pourri, écorces, sciures et copeaux de bois, moins fréquent sur autres substrats

Remarques: Ce *Fuligo* a une belle couleur blanche qui aide à son identification. Il est considéré comme une variété de *F. septica* par plusieurs auteurs.

Confusion: Fleur de tan (*Fuligo septica*)
couleur

Détermination: Carpophore > Ni lamelles, ni tubes, ni pores, ni aiguillons sous le chapeau > Entièrement à l'air libre à maturité > Champignon étalé, en forme de croûte > Chair molle, irrégulière, presque gluante > Chair jaune > *Fuligo*

Classification: -

Photos:



Fleur de tan



Comestible, sans valeur

Recommandation officielle:



NON COMESTIBLE

Nom latin: *Fuligo septica*

Famille: Autres > Physaraceae > *Fuligo*

Caractéristiques du genre *Fuligo*: chapeau: en forme de mousse - lames: inexistant, spores noires - pied: inexistant - remarques: entre le règne des champignons et des protozoaires

Synonymes: *Fuligo septica* f. *rufa*, *Fuligo septica* f. *candida*, *Fuligo septica* var. *candida*, *Fuligo septica* var. *rufa*, *Aethalium septicum* var. *rufum*, *Aethalium rufum*, *Reticularia rufa*, *Aethalium septicum*, *Aethalium candidum*, *Aethalium violaceum*, *Aethalium septicum* f. *rufum*, *Aethalium septicum* f. *violaceum*, *Fuligo violacea*, *Fuligo candida*, *Fuligo rufa*, *Reticularia septica*, *Mucor septicus*

Chapeau: 2-20 cm, parfois très grand, jusqu'à 500-600 cm², pulviné, irrégulier, jaune brillant, exsudant des gouttelettes brun-rouge à maturité, souvent assez épais, calcaire, fragile, friable, spongieux, rugueux, alvéolé, détachable, formé de filaments grêles, hyalins, parfois peu nombreux, reliés à des nœuds calcaires fusiformes, uniformes, parfois rares ou peu développés, blancs, jaunes à rougeâtres

Lamelles: néant

Pied: sans anneau, néant

Chair: jaune, déliquescente en vieillissant, aspect devenant visqueuse et vitreuse

Odeur: neutre

Saveur: neutre

Habitat: juin-novembre, bois mort humide, troncs, écorces, racines, sciures, débris végétaux, feuilles mortes et sol, parfois plantes vivantes, solitaire ou grégaire, commune


Remarques: cette espèce ne fait plus aujourd'hui partie du règne des champignons, rampe littéralement sur son support pour se nourrir

Confusion: *Fuligo* blanche, crachat de coucou (*Fuligo candida*)
couleur

Détermination: Carpophage > Ni lamelles, ni tubes, ni pores, ni aiguillons sous le chapeau > Entièrement à l'air libre à maturité > Champignon étalé, en forme de croûte > Chair molle, irrégulière, presque gluante > Chair jaune > *Fuligo*

Classification: Protozoa > Myxomycota > Myxomycetes > Physarales > Physaraceae > *Fuligo* > *Fuligo septica*

Photos:





Photos micro:

