Détermination du genre
www.carpophore.ch

- Lamelles sous le chapeau
  - Chair élastique ou molle, du moins dans le chapeau
    - Lames minces véritables
      - Sporée blanche
        - Pas de Volva
          - Pied latéral ou excentrique
            - Chapeau fermement écailleux et pied excentrique
              - Panus
            - Chapeau lisse et pied latéral
              - Chapeau avec couche gélatineuse
                - Panellus — Chapeau grand, lamelles décurrentes
                - Hohenbuehelia — Chapeau petit, lamelles adnées
              - Chapeau sans couche gélatineuse
                - Pleurotus — Chapeau lisse, lamelles blanches
                - Schizophyllum — Chapeau feutré, lamelles roses
          - Pied central
            - Lamelles assez épaisses, espacées, molles, consistance cireuse
              - Camarophyllus — Chapeau blanc, non visqueux
              - Chapeau non blanc ou visqueux
                - Hygrocybe — Couleurs vives, sans trace d'anneau
                - Hygrophorus — Chapeau terne ou sombre, ou blanc et visqueux
            - Lamelles minces ou à consistance non cireuse
              - Lamelles libres
                - Chapeau lisse, plus ou moins visqueux
                  - Leucosagaricus — Chapeau sec
                  - Limacella — Chapeau visqueux
                - Chapeau sec, fibrilleux ou écailleux
                  - Macrolepiota — Pied plus de 15 cm
                  - Pied moins de 15 cm
                    - Cystolepiota — Chapeau farineux
                    - Lepiota — Chapeau non farineux
                - Avec anneau
                  - Armillariella — En touffe, pied svelte
                  - Catathelasma — Isolé, pied robuste, enfarné, anneau double
                - Sans anneau
                  - Lamelles décurrentes
                    - Hygrophoropsis — Lamelles bifurquées
                    - Pied grêle ou en massue
                      - Omphalina — Lames espacées très décurrentes
                      - Xeromphalina — Lames serrées, décurrentes
                      - Pied longueur normale
                        - Rickenella — Pied très long
                        - Odeur de champignon
                      - Micromphale — Odeur de chou pourri ou ail
                    - Lamelles non bifurquées
                      - Oligocybe — Odeur d'amande amère ou anis
                      - Odeur ni d'amande amère, ni anis
                    - Lepiota — Pied robuste et cylindrique, chapeau gris
                  - Lamelles non décurrentes
                    - Cystoderma — Avec anneau granuleux
                    - Chapeau moins de 4 cm
                      - Sans anneau
                        - Pied grêle et fragile
                          - Laccaria — Lamelles espacées rose vif ou violettes
                          - Mycena — Lamelles ni espacées ni rose vif ni violettes
                        - Pied grêle et tenace, résistant à la torsion
                          - Strobilurus — Sur cône de résineux
                          - Marasmius — Pied dur à la pression des doigts
                          - Collybia — Pied souple à la pression des doigts
                          - Pas sur cône de résineux
                    - Chapeau plus de 4 cm
                      - Pied cartilagineux
                        - Ramulina — Pied noir et velouté à la base
                        - Pied pas noir ni velouté à la base
                          - Oudemansiella — Filaments mycéliens tenaces à la base du pied ou chapeau visqueux
                          - Collybia — Pas de cordon mycélien à la base du pied ou chapeau sec
                      - Pied ferme, cylindrique
                        - Sur bois
                          - Tricholomopsis — Au pied de conifères, chapeau sec
                          - Oudemansiella — Sur bois feuillu, chapeau visqueux
                        - Sur terre
                          - Melanoleuca — Pied peu robuste, sujets isolés
                          - Pied robuste ou sujets en touffes
                            - Lyophyllum — Entouffles
                            - Calocybe — Isolé ou en troupes
                            - Champignon blanc ou blanchâtre
                            - Lepista — Pied violacé
                            - Champignon non blanchâtre
                            - Leucocortinarius — Pied à bulbe marginé
                            - Pied non violacé
                              - Tricholoma — Pied sans bulbe marginé
                - Lamelles adnées ou échancrées
                  - Cystoderma — Avec anneau granuleux
                  - Lepiota — Pied robuste et cylindrique, chapeau gris
                  - Chapeau moins de 4 cm
                    - Sans anneau
                      - Pied grêle et fragile
                        - Laccaria — Lamelles espacées rose vif ou violettes
                        - Mycena — Lamelles ni espacées ni rose vif ni violettes
                      - Pied grêle et tenace, résistant à la torsion
                        - Strobilurus — Sur cône de résineux
                        - Marasmius — Pied dur à la pression des doigts
                        - Collybia — Pied souple à la pression des doigts
                        - Pas sur cône de résineux
                  - Chapeau plus de 4 cm
                    - Pied cartilagineux
                      - Ramulina — Pied noir et velouté à la base
                      - Pied pas noir ni velouté à la base
                        - Oudemansiella — Filaments mycéliens tenaces à la base du pied ou chapeau visqueux
                        - Collybia — Pas de cordon mycélien à la base du pied ou chapeau sec
                    - Pied ferme, cylindrique
                      - Sur bois
                        - Tricholomopsis — Au pied de conifères, chapeau sec
                        - Oudemansiella — Sur bois feuillu, chapeau visqueux
                      - Sur terre
                        - Melanoleuca — Pied peu robuste, sujets isolés
                        - Pied robuste ou sujets en touffes
                          - Lyophyllum — Entouffles
                          - Calocybe — Isolé ou en troupes
                          - Champignon blanc ou blanchâtre
                          - Lepista — Pied violacé
                          - Champignon non blanchâtre
                          - Leucocortinarius — Pied à bulbe marginé
                          - Pied non violacé
                            - Tricholoma — Pied sans bulbe marginé
            - Lamelles minces ou à consistance non cireuse
              - Lamelles non libres
                - Lamelles adnées ou échancrées
                  - Chapeau non sphérique, non ocre gris et non ridé à la base
                    - Pied non radicant
                      - Lamelles adhérentes au chapeau
                        - Inocybe — Chapeau campanulé, pâle ou brun, lamelles grises
                        - Chapeau non campanulé ou lamelles non grises
                          - A terre, pas en touffes
                            - Chapeau visqueux
                              - Myxacium — Pied visqueux
                              - Bulbopodium — Pied bulbeux, à marge importante (bol)
                              - Pied non visqueux
                              - Phlegmacium — Pied bulbeux, sans marge, massif
                            - Chapeau non visqueux
                              - Lamelles rouille ferrugineux à maturité, cortine
                              - Talamonia — Pied gaîtré ou annelé
                              - Chapeau hygrophane
                              - Hydrocybe — Pied nu, sans trace ni anneau
                              - Dermocybe — Couleurs vives (jaune, rouge)
                              - Sericocybe — Teintes gris-violets, ocre
                              - Revêtement lisse
                              - Chapeau sec, fibrilleux ou lisse
                              - Cortinarius — Couleur violette
                              - Laprocybe — Couleurs vives, petites mèches
                              - Revêtement pelucheux
                    - Pied radicant
                      - Phaseocollybia — Pied radicant
                      - Lamelles facilement séparables, décurrentes
                        - Ripartites — Chapeau moins de 5 cm
                        - Paellus — Chapeau plus de 5 cm
                    - Pied central
                      - En forme de moule, pied latéral réduit
                        - Crepidotus — Marge droite
                        - Tapinella — Marge enroulée
                - Lamelles non libres
                  - Lamelles décurrentes
                    - Rickenella — Pied très long
                    - Omphalina — Lames espacées très décurrentes
                    - Xeromphalina — Lames serrées, décurrentes
                    - Micromphale — Odeur de chou pourri ou ail
                  - Lamelles adnées ou échancrées
                    - Rickenella — Pied très long
                    - Omphalina — Lames espacées très décurrentes
                    - Xeromphalina — Lames serrées, décurrentes
                    - Micromphale — Odeur de chou pourri ou ail
                  - Lamelles décurrentes ou échancrées
                    - Entoloma — Pied blanchâtre
                    - Lepista — Pied violacé
                  - Lamelles échancrées
                    - Entoloma — Pied blanchâtre
                    - Lepista — Pied violacé
                  - Lamelles décurrentes
                    - Clitopilus
                  - Lamelles échancrées
                    - Clitopilus
                  - Lamelles décurrentes ou échancrées
                    - Entoloma — Pied blanchâtre
                    - Lepista — Pied violacé
                  - Lamelles décurrentes
                    - Rickenella — Pied très long
                    - Omphalina — Lames espacées très décurrentes
                    - Xeromphalina — Lames serrées, décurrentes
                    - Micromphale — Odeur de chou pourri ou ail
                  - Lamelles échancrées
                    - Rickenella — Pied très long
                    - Omphalina — Lames espacées très décurrentes
                    - Xeromphalina — Lames serrées, décurrentes
                    - Micromphale — Odeur de chou pourri ou ail
                  - Lamelles décurrentes ou échancrées
                    - Entoloma — Pied blanchâtre
                    - Lepista — Pied violacé
                  - Lamelles