

Détermination, clé des principaux genres

Ni lamelles, ni tubes, ni pores, ni aiguillons sous le chapeau

Développement entièrement souterrain (Truffes)

Chair marbrée, en labyrinthe

Tuber

Chair non marbrée, tombant en poussière à maturité

Elaphomyces

A l'air libre, pas sous terre, visible

Semi-enterré

Chapeau en forme de boule, pied enterré

Tulostoma

Chapeau spongieux, en forme de boule, parcheminé

Rhizopogon

Entièrement à l'air libre à maturité

Champignon étalé sur le bois en forme de croûte

Chair molle, irrégulière, presque gluante

Chair jaune

Fuligo

Chair non jaune

Exidia

Chair solide, dure

Entièrement étalé, rouge

Hymenochaete

Plus ou moins décollé du support, non rouge

Stereum

Non étalé sur le bois sous forme de croûte

En troupe, en forme de dé à coudre s'ouvrant par un opercule

Cyathus

Ni l'aspect d'une croûte, ni la forme d'un dé à coudre

Petites masses hémisphériques de 0.5 à 1 cm, en général sur bois

Masses dures et ternes

Hypoxylon

Masses molles, rouge orangé, durcissant avec l'âge

Lycogala

Pas l'aspect de petites masses hémisphériques

Avant maturité champignon sphérique, semi-enterré ou au ras du sol

Oeuf partiellement gélatineux, champignon à odeur nauséabonde

Long pied poreux après éclosion

Haut du pied sans rouge

Phallus

Haut du pied avec rouge

Mutinus

Pas de pied après éclosion

Champignon en forme d'étoile de mer

Anthurus

Champignon en forme de sphère grillagée

Clathrus

Pas de couche interne gélatineuse, à maturité sphère laissant échapper un nuage de spores

Couche externe résistante, en écorce

Ecorce s'étale en étoile à maturité

Spores arrondies, verruqueuses

Astraeus

Spores épineuses, verruqueuses

Geastrum

Ecorce ne s'étale pas en étoile à maturité

Scleroderma

Couche externe blanche, souple

Champignon sphérique, sans amorce de pied

Bovista

Champignon en forme de poire

Surface externe couverte de verrues ou aiguillons caducs

Lycoperdon

Surface externe aréolée et fendillée, sans aiguillons caducs

Calvatia

Forme d'origine pas sphérique

Chaire non cassante comme de la cire ou champignon dressé avec tige en massue ou en branches ramifiées

Champignon en forme de cornet ou trompette

Cornet cireux, gris noirâtre extérieur peu plissé

Craterellus

En trompette avec plis fourchus simulant des lamelles

Cantharellus

Pas en forme de trompette, ni de cornet

Chair non cassante, souple ou gélatineuse, cartilagineuse

Tronc ramifié

Rameaux à section circulaire, jaunes

Calocera

Rameaux aplatis, en lanières ou difformes

Rameaux dressés, brun foncé

Thelephora

Rameaux contournés, ocracés à jaunâtres

Sur bois, masse de feuillets gélatineuse, petite taille

Tremella

Ressemble à un chou-fleur rameaux assez fragiles, sur conifères

Sparassis

Tronc non ramifié

Forme d'oreille, sur bois

Auricularia

A terre

Pas de pied distinct, chapeau rose-rouge, en spatule ou cornet fendu

Guepinia

Pied distinct, tête jaune ou verdâtre

Petit chapeau contourné

Leotia

Tête en spatule

Spathularia

Chair fragile ferme et cassante

Pied très mince

Macrotyphula

Pied moyen à épais

Tige simple en massue

A terre, ocre jaunâtre

Clavariadelphus

Sur bois, extérieur noir, chair blanche

Xylaria

Tronc ramifié

Rameaux à section circulaire

Moins de 5-6 cm, tronc blanc, peu ramifié

Clavulina

Plus de 5-6 cm, tronc très ramifié

Ramaria

Rameaux en lanières

Sparassis

Forme n'est pas une tige simple en masse, ni en branche ramifiée, chair peu épaisse, cassante de la cire

Pas de pied distinct

Rouge ou orangé

Orangé, à terre, en automne

Aleuria

Rouge vif, sur bois mort, fin d'hiver

Sarcoscypha

Ni rouge, ni orangé

En forme de coupe fendue, s'enroulant en cornet

Otidea

En forme de coupe, ne s'enroulant pas en forme de cornet

Coupe semi-enterrée, se fendant en étoile à maturité

Intérieur crème blanchâtre, sous cèdre, au printemps

Sepultaria

Intérieur violacé

Sarcosphaera

Coupe ne s'ouvrant pas en étoile, ocracé à brun fauve

Intérieur ocracé, lisse

Peziza

Intérieur brun fauve, boursoufflé à maturité

Discina

Pied bien distinct, pas de rouge

Pied creux, non veiné et chapeau non noir

Pied grêle et chapeau en plaque lobée unie

Leptopodia

Pied robuste, chapeau pas en plaque lobée unie

Chapeau alvéolé, aspect d'une éponge, paroi interne prolonge le pied

Morchella

Chapeau dont la partie basse est rabattue sur le pied

Chapeau en forme de dé à coudre, sans alvéole

Verpa

Chapeau conique, alvéolé

Mitrophora

Pied veiné, lacuneux ou lisse, avec chapeau noir

Pied enterré, fortement veiné, portant une coupe de forme régulière

Paxina

Pied non enterré et chapeau non en coupe

Pied court et peu veiné, chapeau ayant l'aspect d'une cervelle

Gyromitra

Pied long et très veiné, ou lisse avec chapeau noir

Helvella

Détermination, clé des principaux genres

Aiguillons sous le chapeau	
Champignon mou et d'aspect gélatineux	
Pseudohydnum	
Champignon à chair ferme	
En forme de touffe	
Hericiidum	
Pas en forme de touffe	
Chapeaux imbriqués, chair liégeuse	
Odeur de bouillon de viande	
Phellodon	
Pas d'odeur de bouillon de viande	
Hydnellum	
Chapeau unique	
Chapeau lisse, blanchâtre	
Hydnum	
Chapeau écailleux, brunâtre	
Sarcodon	
Tubes ou pores sous le chapeau	
Chair tendre et pied central (Bolets)	
Chapeau écailleux	
Chapeau et pied brun noirâtre	
Strobilomyces	
Chapeau jaune fauve à brun-roux, pied creux	
Boletinus	
Chapeau non écailleux	
Pores roses et chair amer	
Tylophilus	
Pores non roses	
Chapeau visqueux ou finement moucheté	
Chair douce	
Suillus	
Chair poivrée	
Chalciporus	
Chapeau non visqueux	
Pied long et couvert de petites écailles	
Leccinum	
Pied non écailleux	
Pied obèse ou pores rouges	
Pied plein et massif	
Boletus	
Pied creux ou cloisonné	
Gyroporus	
Pied peu robuste ou pores non rouges	
Xerocomus	
Chair dure ou pied non central (Polypores)	
A terre, chapeaux soudés, blanchâtres	
Albatrellus	
Sur bois	
Chapeaux multiples	
Dépassant le support de plus de 15 cm	
Entièrement jaune soufre à orangé	
Laetiporus	
Chapeaux gris-brun très nombreux	
Grifola	
Ne dépassant pas le support de plus de 15 cm	
Pores scintillants	
Inonotus	
Chapeaux simples	
Ne dépassant pas le support de plus de 15 cm	
Pied central et grêle	
Chapeau écailleux	
Polyporus	
Chapeau feutré	
Onnia	
Pied latéral ou nul	
Chair épaisse	
Avec tache de goudron	
Ischnoderma	
Sans tache de goudron	
Chair juteuse	
Spongiporus	
Chair non juteuse	
Chair peu résistante	
2 couches: mou dessus, dur dessous, spongieux	
Spongipellus	
Chair homogène	
Chapeau en forme de rein, sur bouleau	
Piptoporus	
Chair tendre et rouge	
Fistulina	
Chair résistante, tubes longs	
Aurantiporus	
Chair mince ou dure comme du bois	
Tubes non violet	
Pores ronds	
Chapeaux multiples et flexibles	
Trametes	
Chapeaux rigides en console	
Chapeau non feutré	
Chapeaux brun-roux très foncé, difformes et de taille souvent médiocre	
Heterobasidion	
Chapeaux de bonne taille, en consoles régulières	
Marge distincte, épaisse, arrondie, jaunâtre puis rougeâtre	
Fomitopsis	
Chapeau coloré uniformément, terne, marge mince	
Ganoderma	
Chapeau feutré	
Coriopsis	
Pores allongés au point de former de véritables lamelles coriaces	
Gloeophyllum	
Tubes violets	
Trichaptum	
Dépassant le support de plus de 15 cm, pluriannuel, chair brun-roux	
Phellinus	

Détermination, clé des principaux genres

Lamelles sous le chapeau

Lames réduites à des plis souvent fourchus

Cantharellus

Lames minces véritables

Chair cassante comme de la craie

Avec lait (latex) qui s'écoule à la cassure

Lactarius

Sans lait

Russula

Chair élastique ou molle, du moins dans le chapeau

Sporée blanche

Avec volve parfois friable

Avec anneau

Amanita

Sans anneau

Amanitopsis

Pas de Volve

Pied latéral ou excentrique

Chapeau finement écaillé et pied excentrique

Panus

Chapeau lisse et pied latéral

Chapeau avec couche gélatineuse

Chapeau grand, lamelles décurrentes

Panellus

Chapeau petit, lamelles adnées

Hohenbuehelia

Chapeau sans couche gélatineuse

Chapeau lisse, lamelles blanches

Pleurotus

Chapeau feutré, lamelles roses

Schizophyllum

Pied central

Lamelles assez épaisses, espacées, molles, consistance cireuse

Chapeau blanc, non visqueux

Camarophyllus

Chapeau non blanc ou visqueux

Couleurs vives, sans trace d'anneau

Hygrocybe

Chapeau terne ou sombre, ou blanc et visqueux

Hygrophorus

Lamelles minces ou à consistance non cireuse

Lamelles libres

Chapeau lisse, plus ou moins visqueux

Chapeau sec

Leucoagaricus

Chapeau visqueux

Limacella

Chapeau sec, fibrilleux ou écaillé

Pied plus de 15 cm

Macrolepiota

Pied moins de 15 cm

Chapeau farineux

Cystolepiota

Chapeau non farineux

Lepiota

Lamelles non libres

Lamelles décurrentes

Avec anneau

En touffe, pied svelte

Armillariella

Isolé, pied robuste, enterré, anneau double

Catathelasma

Sans anneau

Pied grêle ou en massue

Lamelles bifurquées

Hygrophoropsis

Lamelles non bifurquées

Odeur d'amande amère ou anis

Citocybe

Odeur ni d'amande amère, ni anis

Odeur de champignon

Pied très long

Rickenella

Pied longueur normale

Lames espacées très décurrentes

Omphalina

Lames serrées, décurrentes

Xeromphalina

Odeur de chou pourri ou ail

Micromphale

Pied robuste et cylindrique, chapeau gris

Lepista

Lamelles adnées ou échancrées

Chapeau moins de 4 cm

Avec anneau granuleux

Cystoderma

Sans anneau

Pied grêle et fragile

Lamelles espacées rose vif ou violettes

Laccaria

Lamelles ni espacées ni rose vif ni violettes

Mycena

Pied grêle et tenace, résistant à la torsion

Sur cône de résineux

Strobilurus

Pas sur cône de résineux

Pied dur à la pression des doigts

Marasmius

Pied souple à la pression des doigts

Collybia

Chapeau plus de 4 cm

Pied cartilagineux

Pied noir et velouté à la base

Flamulina

Pied pas noir ni velouté à la base

Filaments mycéliens tenaces à la base du pied ou chapeau visqueux

Oudemansella

Pas de cordon mycélien à la base du pied ou chapeau sec

Collybia

Pied ferme, cylindrique

Sur bois

Au pied de conifères, chapeau sec

Tricholomopsis

Sur bois feuillu, chapeau visqueux

Oudemansella

Sur terre

Pied peu robuste, sujets isolés

Melanoleuca

Pied robuste ou sujets en touffes

Champignon blanc ou blanchâtre

En touffes

Lyophyllum

Isolé ou en troupes

Calocybe

Champignon non blanchâtre

Pied violacé

Lepista

Pied non violacé

Pied à bulbe marginé

Leucocortinarius

Pied sans bulbe marginé

Tricholoma

Détermination, clé des principaux genres

Lamelles sous le chapeau

Lames minces véritables

- Chair élastique ou molle, du moins dans le chapeau
- Sporée non blanche
 - Sporée noire
 - Lamelles déliquescentes
 - Coprinus
 - Lamelles non déliquescentes
 - Lamelles roses puis noircissantes
 - Agaricus
 - Lamelles non roses sur les jeunes
 - Lamelles décurrentes, anneau rudimentaire
 - Chapeau peu visqueux brun rougeâtre
 - Chroogomphus
 - Chapeau visqueux, gris-brun, base du pied jaune
 - Gomphidius
 - Lamelles non décurrentes
 - Cortine légère
 - Chapeau hygrophane et fragile
 - Chapeau généralement floconneux, lamelles unies
 - Psathyrella
 - Chapeau en cloche, lamelles tachetées
 - Panaeolus
 - Chapeau non hygrophane tirant sur le jaune
 - Hypholoma
 - Chapeau collant
 - Anneau strié au-dessus
 - Stropharia
 - Sans anneau
 - Psilocybe
- Sporée ni noire ni blanche
 - Sporée rose
 - Apect de Collybia
 - Rhodocybe
 - Apect de Tricholoma, Mycena ou Omphalina
 - Lamelles libres
 - Avec volve
 - Volvariella
 - Sans volve
 - Pluteus
 - Lamelles décurrentes ou échancrées
 - Lamelles décurrentes
 - Clitopilus
 - Lamelles échancrées
 - Pied blanchâtre
 - Entoloma
 - Pied violacé
 - Lepista
- Sporée brun ou rouille
 - Pied central
 - Pied radicant
 - Phaeocollybia
 - Pied non radicant
 - Lamelles facilement séparables, décurrentes
 - Chapeau moins de 5 cm
 - Ripartites
 - Chapeau plus de 5 cm
 - Paxillus
 - Lamelles adhérentes au chapeau
 - Chapeau d'abord sphérique, ocre givré, ridé à la base
 - Rozites
 - Chapeau non sphérique, non ocre givré et non ridé à la base
 - Sur fumier
 - Chapeau couleur vive, pied moyen
 - Bolbitis
 - Chapeau brunâtre, pied fin
 - Conocybe
 - Pas sur fumier
 - En touffes sur bois mort ou au pied des souches
 - Odeur et saveur non farineuses et chapeau hygrophane
 - Kuehneromyces
 - Odeur et saveur farineuses ou chapeau non hygrophane
 - Odeur et saveur farineuses, anneau mince et fragile, en petites touffes ou isolé
 - Galerina
 - Odeur et saveur non farineuses
 - Chapeau fauve rouillé sans écailles retroussées
 - Gymnopilus
 - Chapeau fortement écaillé ou crème verdâtre et visqueux
 - Pholiota
 - A terre, pas en touffes
 - Chapeau campanulé, pâle ou brun, lamelles grises
 - Inocybe
 - Chapeau non campanulé ou lamelles non grises
 - Lamelles rouillé ferrugineux à maturité, cortine
 - Chapeau visqueux
 - Pied visqueux
 - Myxaciium
 - Pied non visqueux
 - Pied bulbeux, à marge importante (bot)
 - Bulbopodium
 - Pied bulbeux, sans marge, massif
 - Phlegmacium
 - Chapeau non visqueux
 - Chapeau hygrophane
 - Pied guêtré ou annelé
 - Telamonia
 - Pied nu, sans trace ni anneau
 - Hydrocybe
 - Chapeau sec, fibrilleux ou lisse
 - Revêtement lisse
 - Couleurs vives [jaune, rouge]
 - Dermocybe
 - Teintes gris-violet, ocre
 - Sericeocybe
 - Revêtement pelucheux
 - Couleur violette
 - Cortinarius
 - Couleurs vives, petites mèches
 - Leprocybe
 - Lamelles brun clair, chapeau beige clair à brun ocre
 - Pied lisse et anneau en membrane mince
 - Agrocybe
 - Pied fibrilleux (cortiné) ou radicant
 - Pied moyen à épais
 - Hebeloma
 - Pied fin
 - Tubaria

- En forme de moule, pied latéral réduit
- Marge droite
 - Crepidotus
- Marge enroulée
 - Tapinella