Polypore tomenteux

Comestible, sans valeur **Recommandation officielle:** NON COMESTIBLE

Nom latin: Onnia tomentosa

Famille: A tubes > Hymenochaetaceae > Onnia

Caract?ristiques du genre Onnia : chapeau: feutré, irrégulièrement lobé, non zoné, chair brun-roux, liégeux-coriace - lames: tubes - pied: pied court - remarques: parasite, saprophyte sur bois, racine, provoque une pourriture blanche

Synonymes: Inonotus tomentosus, Polyporus peakensis, Coltricia tomentosa, Xanthochrous tomentosus, Microporus tomentosus, Mucronoporus tomentosus, Pelloporus tomentosus, Polystictus tomentosus, Polyporus tomentosus

Chapeau: 3-11 cm, simple, circulaire, ovale à flabelliforme, déprimé au centre, parfois lobé, semi-coriace au frais, plutôt contracté et dur au sec, parfois orné de chapeaux secondaires, tomenteux à finement feutré, ondulée, bosselé à rugueux longitudinalement, non à indistinctement zoné concentriquement, brun jaunâtre, brun cannelle à ferrugineux, à marge incurvée, mince, aiguë, ondulée, entière, fertile ou stérile au-dessous, plus pâle, couleur jaune d'or à brun jaunâtre, noueux, partie supérieure molle-spongieuse

Lamelles: tubes, surface chamois pâle au début, grise, gris-brun à brun plus foncé avec l'âge, couche décurrente, mais nettement limitée sur le pied, brune, remplie de mycélium et apparaissant plus pâle que le contexte, jusqu'à 5 mm de longueur, pores irrégulièrement ronds-anguleux, 2-4 par mm, plus grands vers la marge, à dissépiments épais au début, minces et lacérés-fimbriés à l'arête avec l'âge

Pied: jusqu'à 4 x 2 cm, centré, excentré à latéral, souvent fusionné à d'autres à la base, conique, noueux, feutré, brun rouille à concolore au chapeau

Chair: jaune d'or à brun jaunâtre, noueux, duplexe: partie supérieure molle-spongieuse, partie inférieure ferme-fibreuse, jusqu'à 4 mm d'épaisseur au total

Odeur: agréable, de curry

Saveur: douce

Habitat: janvier-décembre, parasitique, sur bois vivant de conifères, racines et bases; agent de carie blanche de coeur, se caractérisant par de grandes alvéoles vides nettement délimitées par le bois ferme, apparemment sain

Remarques: sa chair coriace en fait un champignon non comestible.
Confusion possible avec d'autres Polypore du type Onnia

Confusion: Polypore anisé, Gloeophylle odorant (Gloeophyllum odoratum)
Le Polypore anisé a une odeur typqique

Détermination: Carpophore > Tubes ou pores sous le chapeau > Chaire dure ou pied non central (Polypores) > Sur bois > Chapeaux simples > Ne dépassant pas le support de plus de 15 cm > Pied central et grêle > Chapeau feutré > Onnia

Classification: Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Hymenochaetales > Hymenochaetaceae > Inonotus

Photos: