

# Hydne roussissant, Pied-de-mouton roussissant



**Comestible**

*Nom latin: Hydnum repandum var. rufescens*

*Famille: A aiguillons > Hydnaceae > Hydnum*

*Caractéristiques du genre Hydnum : chapeau: face inférieure du chapeau couverte d'aiguillons pâles, cassant, chair blanchâtre, non zonée, cassant, saveur de flocon d'avoine, piquant après longue mastication - lames: aiguillons pâles - pied: central à excentrique - remarques: mycorrhizien*

- Chapeau:** 3-7cm, d'abord convexe irrégulier puis franchement dissymétrique voire bosselé, jaune-orangé à roux-orangé, cuticule adnée, sèche, mate, craquelée par le sec, roussâtre, orangé rougeâtre, non zonée et non écailleuse. Marge largement enroulée au début puis s'étalant et devenant lobée et sinueuse
- Lamelles:** sans lame, aiguillons épais, d'abord blancs et peu développés puis oranges à roussâtres en vieillissant, facilement détachables, relativement peu décurrents
- Pied:** sans anneau, relativement centré (contrairement au pied de mouton), de 3 à 5 cm, plus clair que le chapeau, à tendance roussissante surtout aux blessures
- Chair:** peu charnue, cassante, roussissant à la cassure
- Odeur:** faible, agréablement fruitée
- Saveur:** de mousse, devient amer avec l'âge
- Habitat:** juillet-novembre, surtout dans les bois de résineux mais aussi de feuillus
- Remarques:** idéal pour faire des conserves au vinaigre. Parfois soudés ensemble par le pied.
- Confusion:** Pied-de-Mouton (*Hydnum repandum*)  
*également avec le Polypore des brebis, peu fréquent en Suisse romande*
- Détermination:** Carpophore > Aiguillons sous le chapeau > Champignon à chair ferme > Pas en forme de touffe > Chapeau unique > Chapeau non écailleux, blanchâtre > Hydnum

