

Bolet rude



Comestible

Recommandation officielle:



COMESTIBLE

Nom latin: *Leccinum scabrum*

Famille: A tubes > Boletaceae > Leccinum

Caractéristiques du genre *Leccinum* : chapeau: sec, mat à velouté, tout au plus un peu collant avec l'âge - lames: tubes facilement séparables, ventrus sur les vieux exemplaires - pied: généralement assez mince, réticulé - remarques: mycorrhizien

- Synonymes:** *Leccinum scabrum* var. *roseofractum*, *Leccinum scabrum* var. *avellaneum*, *Boletus roseofractus*, *Leccinum rigidipes*, *Krombholziella avellanea*, *Krombholziella roseofracta*, *Leccinum avellaneum*, *Boletus avellaneus*, *Leccinum subcinnamomeum*, *Leccinum roseofractum*, *Trachypus scaber*, *Krombholziella scabra*, *Ceromyces scaber*, *Gyroporus scaber*, *Krombholzia scabra*, *Boletus scaber*
- Chapeau:** 4-15cm, d'abord hémisphérique, globuleux et épais, puis vite étalé, non cabossé. Marge épaisse, non débordante et laissant vite apparaître les tubes, régulière, lisse, entière, concolore. Cuticule séparable sur vieux sujets, adnée quand jeunes. Sa surface est humide, au début, finement pruinée sans être franchement veloutée, grasse à l'humidité, parfois fendillée au sec, aux couleurs assez variables : du brun clair jaunâtre au brun-fauve, brun-rougeâtre ou brun-noir. Elle se gerce et se fissure très tôt, et dispose de vagues dépressions très caractéristiques ressemblant à des empreintes de doigt sur le pourtour
- Lamelles:** néant. Les tubes sont fins, longs, blanchâtres puis grisonnants en vieillissant, à extrémités jaunâtres
- Pied:** long et élancé, presque fibreux, plutôt tenace, en général épaissi de haut en bas, orné de granulations d'abord grises puis marron foncé assez en relief sur un fond rugueux et pâle, simili-structurées
- Chair:** ferme au début et devient assez tôt molle, blanche au début parfois jaunie sous les tubes mais elle vire au rosé après la coupe et noircit même chez espèces assez voisines
- Odeur:** faible ou légèrement acidulée
- Saveur:** douce
- Habitat:** juillet-octobre, dans les bois clairs, pinèdes humides, en mélange avec des bouleaux mais aussi d'autres feuillus, se développant souvent aussi parmi les feuilles de lierre rampant lorsqu'il fait sec
- Remarques:** généralement trop mou, insipide et souvent gluant.
- Confusion:** Cèpe des pins (*Boletus pinophilus*)
également Bolet des peupliers, rare en Suisse romande
- Conservation:** Séchage: les vieux exemplaires ont tendance à devenir très mous - Poudre
- Détermination:** Carpophore > Tubes ou pores sous le chapeau > Chair tendre et pied central (Bolets) > Chapeau non écailleux > Pores non roses > Chapeau non visqueux > Pied long et couvert de petites écailles > *Leccinum*
- Classification:** Fungi > Dikarya > Basidiomycota > Agaricomycotina > Agaricomycetes > Agaricomycetidae > Boletales > Boletaceae > *Leccinum* > *Leccinum scabrum*

Photos:



